

CATÁLOGO DE PRODUTOS **VETERINÁRIOS** *PET*

CIÊNCIA, QUALIDADE
E CONFIANÇA PARA
CUIDAR SEMPRE.

labovet.com.br

**LABO
NET**



Cultivando saúde,
impulsionando o
sucesso e produzindo
a fórmula do
bem-estar animal.

A FÓRMULA DO
BEM-ESTAR ANIMAL

labovet.com.br

**LABO
NET**



História do Labovet



Em 1990, iniciaram-se em Feira de Santana-BA as atividades do **Labovet Produtos Veterinários**, que desde o início tem como foco promover a saúde animal de forma única.

Avançando com passos firmes, o Labovet se desenvolveu por meio de uma trajetória de crescimento e inovação, consolidando-se como referência para outros laboratórios, principalmente na produção de biológicos.

Em seu portfólio, a empresa oferece uma renomada linha de vacinas, vitaminas, carrapaticida, antiparasitários, estimulantes, além de produtos para higiene e embelezamento destinados a animais de criação e de produção. Todo o processo produtivo é realizado por equipe altamente especializada, seguindo um **rigoroso controle de qualidade e segurança**, atendendo todas as normas e regulamentações exigidas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

Com uma vasta rede de representantes e distribuidores espalhados por todo o Brasil, o Labovet também marca presença internacionalmente, atendendo a diversos países da América Latina, África e Ásia. Toda a logística é projetada para maximizar e oferecer as melhores soluções e alternativas em Medicina Veterinária.

Fundamentada em valores como **ética, respeito, qualidade e transparência**, a missão do Labovet é fornecer produtos seguros e de alta qualidade para atender às necessidades dos clientes e promover o bem-estar dos colaboradores, com responsabilidade ambiental.

São mais de 3 décadas de experiência e investimentos para melhoria contínua, com o objetivo de oferecer o que há de melhor em soluções e alternativas para a saúde e bem-estar animal.







Vacinas

PET

Vacina V11 Elevencell Vac®

Vacina combinada contra a Cinomose, Hepatite Infecçiosa, Adenovirose, Parvovirose, Parainfluenza, Coronavirose e Leptospirose Canina. (*L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. pomona*, *L. grippotyphosa* e *L. copenhageni*).



COMPOSIÇÃO:

A fração liofilizada é composta de suspensões de vírus vivo atenuado de Cinomose, Hepatite Infecçiosa, Adenovírus tipo 2, Parvovírus e Parainfluenza Canina. A fração líquida é composta pela associação da suspensão viral inativada do Coronavírus canino e suspensões bacterianas inativadas de *L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. pomona*, *L. grippotyphosa* e *L. copenhageni*.

INDICAÇÕES:

Profilaxia das infecções causadas pelo Vírus da Cinomose canina, Vírus da Hepatite Infecçiosa Canina, Adenovírus Canino tipo 2, Parvovirose Canina, Parainfluenza Canina, Coronavirose Canina, *Leptospira canicola*, *Leptospira icterohaemorrhagiae*, *Leptospira pomona*, *Leptospira grippotyphosa* e *Leptospira copenhageni*.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR:

Administrar pela via subcutânea, observando os cuidados usuais de assepsia.

Dose: 1 mL.

*Resultado comprovado com certificação internacional a partir de ensaios clínicos que comparam a eficácia da Vacina Elevencell à vacina importada.

ESQUEMA DE VACINAÇÕES RECOMENDADAS:

VACINAÇÃO PRIMÁRIA:

FILHOTES: A presença de anticorpos maternos circulantes nos filhotes interfere no desenvolvimento da imunidade ativa. Desta forma, o programa de vacinação recomendado é o seguinte:

1º Dose: 6 semanas

2º Dose: 9 semanas

3º Dose: 12 semanas

O ciclo de proteção oferecido pela vacina estará concluído 21 dias após a 3ª dose vacinal, porém para animais expostos a riscos ou que habitam em zonas endêmicas e frequentam locais contaminados, recomenda-se a administração da 4ª dose às 16 semanas de idade, o que irá aumentar em muito a produção de anticorpos. Quem deverá elaborar o melhor esquema é o Médico Veterinário, que conhece as condições físicas e ambientais do animal.

VACINAÇÃO DE REFORÇO:

Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES E PREPARAÇÃO:

Consulte a bula do produto.

APRESENTAÇÕES:

Caixa Isotérmica contendo 15 frascos com 1 dose da fração liofilizada e 15 frascos com 1 mL da fração diluente para reconstituição.

CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C e 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 9.411 em 12/09/08.



Acesse o QrCode ao lado ou o Site elevencell.com.br e leia o Artigo Publicado na Revista Veterinary Medicine and Science Published.

Vacina Octocell Vac®

Vacina combinada contra a Cinomose, Hepatite Infecciosa, Adenovirose, Parvovirose, Parainfluenza, Coronavirose e Leptospirose Canina (*L. canicola* e *L. icterohaemorrhagiae*).



COMPOSIÇÃO:

A fração liofilizada é composta de suspensões de vírus vivo atenuado de Cinomose, Hepatite Infecciosa, Adenovírus tipo 2, Parvovírus e Parainfluenza Canina. A fração líquida é composta pela associação da suspensão viral inativada de Coronavírus canino e suspensões bacterianas inativadas de *L. canicola* e de *L. icterohaemorrhagiae*.

INDICAÇÕES:

Profilaxia das infecções causadas pelo Vírus da Cinomose canina, Vírus da Hepatite Infecciosa Canina, Adenovírus Canino tipo 2, Parvovirose Canina, Parainfluenza Canina, Coronavirose Canina, *Leptospira canicola* e *Leptospira icterohaemorrhagiae*.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR:

Administrar pela via subcutânea ou intramuscular, observando os cuidados usuais de assepsia. Se subcutânea, as regiões preferidas são no flanco ou dorso e se intramuscular, no músculo externo da coxa (glúteo).

Dose: 1 mL.

Preparação do produto:

1. Usar seringas e agulhas descartáveis (calibre 25 x 7).
2. Aspirar todo o conteúdo da fração líquida.
3. Reconstituir a fração liofilizada. Utilizar somente o diluente fornecido pelo fabricante.
4. Agitar até obter a completa reconstituição da pastilha.
5. Após a reconstituição, usar imediatamente.

ESQUEMA DE VACINAÇÕES RECOMENDADAS:

VACINAÇÃO PRIMÁRIA:

FILHOTES: A presença de anticorpos, maternos circulantes nos filhotes, interfere no desenvolvimento da imunidade ativa. Desta forma, o programa de vacinação recomendado é o seguinte:

1ª Dose: 6 semanas

2ª Dose: 9 semanas

3ª Dose: 12 semanas

O ciclo de proteção oferecido pela vacina estará concluído 21 dias após a 3ª dose vacinal, porém para animais expostos a riscos ou que habitam em zonas endêmicas e frequentam locais contaminados, recomenda-se a administração da 4ª dose às 16 semanas de idade, o que irá aumentar em muito a produção de anticorpos. Quem deverá elaborar o melhor esquema é o Médico Veterinário, que conhece as condições físicas e ambientais do animal.

VACINAÇÃO DE REFORÇO:

Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES:

Consulte a bula do produto.

APRESENTAÇÕES:

Caixa Isotérmica contendo 15 frascos com 1 dose da fração liofilizada e 15 frascos com 1mL da fração diluente para reconstituição.

CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C e 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.095 em 03/10/99.

Vacina Antirrábica Inativada Labovet Cães e Gatos



COMPOSIÇÃO:

Composta por suspensão de vírus rábico fixo, inativada por etilenimina binária (BEI), cepa Pasteur (PV) produzida em cultivo celular e adsorvida em hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO:

Profilaxia da raiva em cães e gatos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR:

Administrar pela via subcutânea observando os cuidados usuais de assepsia.

Dose: 1 mL.

Primeira dose: a partir dos 3 meses de idade.

A imunidade é conferida a partir de 21 dias da aplicação e persiste por 12 meses.

Animais vacinados devem ser revacinados anualmente.

Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES:

Consulte a bula do produto.

APRESENTAÇÕES:

Caixa isotérmica contendo 20 frascos com 1mL.

CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C e 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.197 em 25/11/97.



Vacina Threecell Vac® Puppy

Vacina combinada contra a Cinomose, Parvovirose e Coronavirose Canina.



COMPOSIÇÃO:

A fração liofilizada é composta de suspensões de vírus vivo atenuado de Cinomose e Parvovírus canino. A fração líquida é composta de suspensão viral inativada do Coronavírus canino.

INDICAÇÃO:

Indicada para cães, na profilaxia de infecções causadas pelo vírus da Cinomose canina, vírus da Parvovirose canina e Coronavirose canina.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR:

Administrar pela via subcutânea, observando os cuidados usuais de assepsia.

Dose: 1 mL.

Preparação do produto:

1. Usar seringas e agulhas descartáveis (calibre 25 x 7).
2. Aspirar todo o conteúdo da fração líquida.
3. Reconstituir a fração liofilizada. Utilizar somente o diluente fornecido pelo fabricante.
4. Agitar até obter a completa reconstituição da pastilha.
5. Após a reconstituição, usar imediatamente.

ESQUEMAS DE VACINAÇÕES RECOMENDADAS:

VACINAÇÃO PRIMÁRIA:

FILHOTES: A presença de anticorpos, maternos circulantes nos filhotes, interfere no desenvolvimento da imunidade ativa. Desta forma, o programa de vacinação recomendado é o seguinte:

- 1ª Dose:** 6 semanas
- 2ª Dose:** 9 semanas
- 3ª Dose:** 12 semanas

O ciclo de proteção oferecido pela vacina estará concluído 21 dias após a 3ª dose vacinal, no entanto, animais expostos a riscos ou que habitam em zonas endêmicas e frequentam locais contaminados, recomenda-se a administração da 4ª dose às 16 semanas de idade, o que irá aumentar em muito a produção de anticorpos. Quem deverá elaborar o melhor esquema é o Médico Veterinário, que conhece as condições físicas e ambientais do animal.

VACINAÇÃO DE REFORÇO:

Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES:

Consulte a bula do produto.

APRESENTAÇÕES:

Caixa Isotérmica contendo 15 frascos com 1 dose da fração liofilizada e 15 frascos com 1 mL da fração diluente para reconstituição.

CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C e 8°C. **NÃO CONGELAR.** Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10.159 em 13/10/15.



Farmacêuticos

PET

Etimag® Oto Clean

Solução ceruminolítica para higienização dos ouvidos de cães e gatos.



- ✓ Não irritante.
- ✓ Efeito ceruminolítico, queratolítico e secante.
- ✓ Alívio do prurido e redução de odores desagradáveis.

INDICAÇÕES:

É uma solução ceruminolítica não irritante para a higienização do conduto auditivo e do pavilhão auricular de cães e gatos. Indicado na limpeza de manutenção e antes da aplicação de outros medicamentos para tratar as otites externas. Este produto realiza uma higiene adequada e aumenta a eficácia da terapia tópica, pois remove o excesso de cerume, auxiliando ao mesmo tempo no que diz respeito aos agentes infecciosos que impedem o contato do medicamento com o epitélio do canal auditivo. Apresenta ainda efeitos queratolíticos e secantes que auxiliam na cicatrização e recuperação do epitélio do ouvido, além de aliviar o prurido e reduzir odores desagradáveis.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Ácido Salicílico.....0,50 g
Veículo q.s.p.....100,0 mL

MODO DE USAR:

Uso tópico. Aplique de 5 a 10 gotas do produto em cada conduto auditivo, massageie a base da orelha de maneira a recobrir todo epitélio com a solução. Pode ser usada duas a três vezes por semana na limpeza rotineira ou antes de outro produto terapêutico.

PRECAUÇÕES:

Consulte o rótulo-bula do produto.

APRESENTAÇÃO:

Frasco contendo 100 mL.

CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto na embalagem original, em local seco e fresco, com temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar e longe do alcance de crianças e animais domésticos.



Etimag® Oto Septic

Solução antisséptica para desinfecção de orelhas de cães e gatos.



- ✓ Ideal para tratamento e prevenção de otites externas.
- ✓ Contém Extrato de Aloe Vera, composto emoliente, umectante e cicatrizante.

INDICAÇÕES:

Solução antisséptica não irritante indicada para desinfecção das orelhas. Possui propriedades antibacterianas e antifúngicas e pode ser utilizada rotineiramente, tanto na prevenção de otites externas bem como no seu tratamento. Apresenta ainda efeitos queratolíticos, emolientes e umectantes, que auxiliam na cicatrização e recuperação de epitélio do ouvido, além de aliviar o prurido e reduzir os odores desagradáveis.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:
Clorexidina (digluconato).....0,10 g
Extrato de Aloe Vera.....1,0 g
Veículo q.s.p.....100,0 mL

MODO DE USAR:

Uso tópico. Antes da aplicação deve-se realizar uma limpeza do conduto auditivo com medicamentos adequados para este fim, (solução de limpeza auricular), pois o excesso de cerume e agentes infecciosos impedem o contato do medicamento com o epitélio do canal auditivo, diminuindo a eficácia do tratamento. Em seguida, aplicar de 5 a 10 gotas do produto em cada conduto auditivo de maneira adequada a recobrir o epitélio do canal auditivo externo e massagear a base da orelha para melhor penetração. Para tratamento, repetir a operação de 2 a 3 vezes por semana pelo período de 3 a 4 semanas, ou até a cura. Como medida preventiva da otite externa e outros problemas do ouvido de cães e gatos, aplicar rotineiramente 1 vez por semana.

PRECAUÇÕES:

Consulte o rótulo-bula do produto.

APRESENTAÇÃO:

Frasco contendo 100 mL.

CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto na embalagem original, em local seco e fresco, com temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar e longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Vermkill® Suspensão

Vermífugo oral de amplo espectro em suspensão para cães.



✓ **Controla os vermes gastrointestinais do seu Pet em dose única.**

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Pamoato de pirantel.....1,44 g

Praziquantel.....0,50 g

Veículo q.s.p.....100,0 mL

INDICAÇÕES:

Vermkill Suspensão é um vermífugo oral de amplo espectro indicado no combate aos cestódeos e nematódeos que acometem os cães.

Cestódeos: *Echinococcus granulosos*, *Echinococcus multiloculares*, *Dipylidium caninum*, *Taenia ovis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp*, *Hydatigena taeniaeformis*, *Joyeuxiella pasqualei*.

Nematódeos: *Toxocara canis*, *Toxocara leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*.

MODO DE USAR:

Administrar por via oral. Verifique o peso do animal para calcular a dose correta do tratamento. Agite bem o frasco e com ajuda da seringa dosadora, administrar o Vermkill Suspensão na dosagem de 1 mL para cada kg de peso, em dose única, diretamente na boca, sendo preferível que o animal não esteja de estômago vazio. O Vermkill Suspensão pode ser utilizado em filhotes a partir de 4 semanas. Utilizar a graduação indicativa da seringa dosadora.

APRESENTAÇÃO:

Frasco de 20mL e seringa dosadora de 3mL.

PRECAUÇÕES, EFEITOS COLATERAIS, CONTRAINDICAÇÕES E INTERAÇÕES

MEDICAMENTOSAS:

Consulte a bula do produto.

CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto na embalagem original, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), ao abrigo da luz solar e longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Vermkill® Plus Comprimidos

Vermífugo oral de amplo espectro em comprimidos para cães e gatos.



✓ Ação combinada do PAMOATO DE PIRANTEL, PRAZIQUANTEL e FENBENDAZOLE.

✓ 01 comprimido trata 10 kg de peso.

FÓRMULA:

Cada comprimido contém:

Pamoato de pirantel.....	144,0 mg
Praziquantel.....	50,0 mg
Fenbendazole.....	500,0 mg
Excipiente q.s.p.....	940,0 mg

INDICAÇÕES:

Indicado no combate aos cestódeos e nematódeos que acometem cães e gatos: *Trichuris vulpis*, *Trichinella spiralis*, *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*, *Echinococcus granulosus*,

Echinococcus multilocularis, *Dipylidium caninum*, *Taenia ovis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp*, *Hydatigera taeniaeformis* e *Joyeuxiella pasqualei*.

MODO DE USAR:

Administrar por via oral, na dosagem de 1 comprimido para cada 10 kg de peso do animal, em dose única, ou a critério do Médico Veterinário. O medicamento pode ou não ser misturado a alimentos, sendo preferível que o animal não esteja de estômago vazio.

PRECAUÇÕES, EFEITOS COLATERAIS, CONTRAINDICAÇÕES E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Consulte a bula do produto.

PRECAUÇÕES, EFEITOS COLATERAIS, CONTRAINDICAÇÕES E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Consulte a bula do produto.

APRESENTAÇÕES:

Blisters contendo 04 comprimidos de 940 mg cada.

CONSERVAÇÃO:

Conservar em local fresco e seco (15°C a 30°C), fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Vermkill® Plus Suspensão

Vermífugo oral de amplo espectro em suspensão
para cães e gatos.



MODO DE USAR:

Administrar por via oral, na dosagem de 1 mL para cada kg de peso animal, em dose única, ou a critério do Médico Veterinário. O medicamento pode ou não ser misturado a alimentos, sendo preferível que o animal não esteja de estômago vazio. Utilizar a graduação indicativa do dosador, que acompanha o medicamento.

PRECAUÇÕES, EFEITOS COLATERAIS, CONTRAINDICAÇÕES E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Consulte a bula do produto.

APRESENTAÇÃO:

Frasco contendo 20 mL.

CONSERVAÇÃO:

Conservar em local fresco e seco (15°C a 30°C), fora do alcance de crianças e animais domésticos.

- ✓ Ação combinada do PAMOATO DE PIRANTEL, PRAZIQUANTEL e FENBENDAZOLE.
- ✓ 01 mL por kg de peso.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Pamoato de pirantel.....	1,44 g
Praziquantel.....	0,50 g
Fenbendazole.....	5,00 g
Veículo q.s.p.....	100,0 mL

INDICAÇÕES:

Indicado no combate aos cestódeos e nematódeos que acometem cães e gatos: *Trichuris vulpis*, *Trichinella spiralis*, *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia ovis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp*, *Hydatigera taeniaeformis* e *Joyeuxiella pasqualei*.

Shampoo Antisséptico MagDog®

Shampoo antisséptico à base de clorexidina para utilização em cães e gatos.



✓ Cuidado e prevenção contra infecções de pele.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Digluconato de clorexidina a 20%.....0,50 g

Veículo q.s.p.....100,0 mL

INDICAÇÕES:

Indicado para o embelezamento e higienização de cães e gatos, na prevenção e auxílio terapêutico das infecções de pele provocadas por pulgas ou outros agentes. Proporciona uma perfeita higiene e condicionamento para todos os tipos de pelos, deixando-os macios e levemente perfumados.

MODO DE USAR:

Molhe o animal. Aplique sobre todo o corpo começando pela cabeça em direção à cauda, massageie em sentido contrário ao dos pelos, e evite a área dos olhos. Deixe o animal coberto pelo produto durante 3 minutos. Logo depois, enxágue o animal e reaplique o produto, repetindo a operação inicial.

APRESENTAÇÕES:

Frascos contendo 200 mL e 480 mL.

ELEVENCELL

PROTEÇÃO TOTAL CONTRA AS
PRINCIPAIS DOENÇAS CANINAS



VACINA
BRASILEIRA
**TESTADA E
COMPROVADA***
CIENTIFICAMENTE



Saiba mais em
www.elevencell.com.br

**LABO
VET**
PRODUTOS VETERINÁRIOS



**LABOVET PRODUTOS
VETERINÁRIOS LTDA**
Av. Banco do Nordeste, 455
Centro Industrial do Subaé - CIS
Cep: 44.010-665 - Caixa Postal 363

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

 **0800 703 1346**
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br

Feira de Santana - BA
+55 (75) 3612-4700

Filiais:

Goiânia - GO
+55 (62) 3207-5533

Valinhos - SP
+55 (19) 3849-2339