

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
Caixa Postal 363
CEP: 44010-665
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 3.747 em 14/06/91.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 50 mL, contendo 25 doses.
PART.:
FABR.:
VENC.:

**VACINA
ANTICARBUNCULOSA**
Bacillus anthracis viva



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 50 mL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

VENDA SOB PRESCRIÇÃO OBRIGATORIA E
APLICACAO SOB ORIENTACAO DO
MEDICO VETERINARIO.

COMPOSIÇÃO: Composta por suspensão de esporos da amostra Sterne do *Bacillus anthracis*, adicionada em salina glicero saponinada.
INDICAÇÃO: Profilaxia do Carbúnculo Hemático para bovinos, ovinos e caprinos.
VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 2 mL. Ovinos e Caprinos: 1 mL. Vacinar a partir dos 4 meses de idade. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.
PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar antes dos 4 meses de idade / Não vacinar animais doentes, paratuberculados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Não utilizar qualquer tipo de substância química que possa inativar o produto / Incinerar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.
CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.



Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
Caixa Postal 363
CEP: 44010-665
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob n° 3.747 em 14/06/91.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 100 mL, contendo 50 doses.
PART.:
FABR.:
VENC.:

**VACINA
ANTICARBUNCULOSA
Bacillus anthracis viva**



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 100 mL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

VENDA SOB PRESCRIÇÃO OBRIGATÓRIA E
APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO
MÉDICO VETERINÁRIO.

COMPOSIÇÃO: Composta por suspensão de esporos da amostra Sterne do *Bacillus anthracis*, adicionada em salina glicero saponinada.

INDICAÇÃO: Profilaxia do Carbúnculo Hemático para bovinos, ovinos e caprinos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 2 mL. Ovinos e Caprinos: 1 mL. Vacinar a partir dos 4 meses de idade. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar antes dos 4 meses de idade / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Não utilizar qualquer tipo de substância química que possa inativar o produto / Incinerar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.



Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
Caixa Postal 363
CEP: 44010-665
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 3.747 em 14/06/91.
Responsável Técnico:
Dr^a Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 250 mL, contendo 125 doses.
PART.:
FABR.:
VENC.:

**VACINA
ANTICARBUNCULOSA**
Bacillus anthracis viva



Uso Veterinário
Injetável



LABOVET

Conteúdo: 250 mL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

VENDA SOB PRESCRIÇÃO OBRIGATÓRIA E
APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO
MÉDICO VETERINÁRIO.

COMPOSIÇÃO: Composta por suspensão de esporos da amostra Sterne do *Bacillus anthracis*, adicionada em salina glicero saponinada.

INDICAÇÃO: Profilaxia do Carbúnculo Hemático para bovinos, ovinos e caprinos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 2 mL. Ovinos e Caprinos: 1 mL. Vacinar a partir dos 4 meses de idade. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar antes dos 4 meses de idade / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Não utilizar qualquer tipo de substância química que possa inativar o produto / Incinerar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.