

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana - BA
CEP: 4410-465
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1345
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 6.197 em 25/11/97.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 20 mL, contendo 10 doses.



Conteúdo: 20 mL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Composta por suspensão de vírus vivo, cepa Pasteur (PV), produzida em cultivo celular, inativada por estereina bintata (BE) e adsorvida em hidróxido de alumínio gel.
INDICAÇÃO: Profilaxia da raiva em bovinos, ovinos, caprinos, equinos e suínos.
VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Bovinos, ovinos e caprinos: 2 mL, pela via subcutânea ou intramuscular. Equinos e suínos: 2 mL, via intramuscular. Vacinar os animais a partir dos 3 meses de idade. Animais primovacinações deverão ser revacinados após 30 dias. A imunidade é conferida a partir de 21 dias da aplicação e persiste por 12 meses. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.
PRECAUÇÕES: Não pode ser usado em animais silvestres / Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, paratuberculosos, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.
CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C e 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.



Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana - BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob n° 6.197 em 25/11/97.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 40 mL, contendo 20 doses.

**VACINA
ANTIRRÁBICA
INATIVADA
PARA HERBÍVOROS**



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 40 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Composta por suspensão de vírus vivo, cepa Pasteur (PV), produzida em cultivo celular, inativada por etilenoimina binária (BEI) e adsorvida em hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia da raiva em bovinos, ovinos, caprinos, equinos e muaras.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Bovinos, ovinos e caprinos: 2 mL, pela via subcutânea ou intramuscular. Equinos e muaras: 2 mL, via intramuscular. Vacinar os animais a partir dos 3 meses de idade. Animais primovacinados deverão ser revacinados após 30 dias. A imunidade é conferida a partir de 21 dias da aplicação e persiste por 12 meses. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Não pode ser usado em animais silvestres / Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.
CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.



Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana - BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob n° 6.197 em 25/11/97.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 50 mL, contendo 25 doses.

**VACINA
ANTIRRÁBICA
INATIVADA
PARA HERBÍVOROS**



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 50 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Composta por suspensão de vírus vivo, cepa Pasteur (PV), produzida em cultivo celular, inativada por etilénimina binária (BEI) e adsorvida em hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia da raiva em bovinos, ovinos, caprinos, equinos e muaras.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Bovinos, ovinos e caprinos: 2 mL, pela via subcutânea ou intramuscular. Equinos e muaras: 2 mL, via intramuscular. Vacinar os animais a partir dos 3 meses de idade. Animais primovacinados deverão ser revacinados após 30 dias. A imunidade é conferida a partir de 21 dias da aplicação e persiste por 12 meses. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Não pode ser usado em animais silvestres / Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.
CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.



Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana - BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 6.197 em 25/11/97.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 100 mL, contendo 50 doses. INDÚSTRIA BRASILEIRA

**VACINA
ANTIRRÁBICA
INATIVADA
PARA HERBÍVOROS**



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 100 mL

COMPOSIÇÃO: Composta por suspensão de vírus fixo, cepa Pasteur (PV), produzida em cultivo celular, inativada por etilenimina binária (BEI) e adsorvida em hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia da raiva em bovinos, ovinos, caprinos, equinos e muarens.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Bovinos, ovinos e caprinos: 2 mL pela via subcutânea ou intramuscular. Equinos e muarens: 2 mL via intramuscular. Vacinar os animais a partir dos 3 meses de idade. Animais primovacinados deverão ser revacinados após 30 dias. A imunidade é conferida a partir de 21 dias da aplicação e persiste por 12 meses. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Não pode ser usado em animais silvestres / Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, submetidos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.



Partida, Fabricação
e Vencimento:
VIDE FRASCO
7189781711302396