

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 3.741 em 24/05/91.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 50 mL, contendo 10 doses.
Partida, Fabricação
e Vencimento:
VIDE FRASCO

VACINA CONTRA O BOTULISMO



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 50 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Composta pela associação das suspensões de *Clostridium botulinum* C e D inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia do Botulismo em bovinos, ovinos e caprinos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 5 mL. Ovinos e Caprinos: 2 mL. Vacinar os animais a partir dos 4 meses de idade, revacinando os primovacinados 4 semanas após a primeira vacinação. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 3.741 em 24/05/91.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 100 mL, contendo 20 doses.
Partida, Fabricação
e Vencimento:
VIDE FRASCO

VACINA CONTRA O BOTULISMO



Uso Veterinário
Injetável



LABOVET

Conteúdo: 100 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Composta pela associação das suspensões de *Clostridium botulinum* C e D inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia do Botulismo em bovinos, ovinos e caprinos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 5 mL. Ovinos e Caprinos: 2 mL. Vacinar os animais a partir dos 4 meses de idade, revacinando os primo-vacinados 4 semanas após a primeira vacinação. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 3.741 em 24/05/91.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 250 mL, contendo 50 doses.
Partida, Fabricação
e Vencimento:
VIDE FRASCO

VACINA CONTRA O BOTULISMO



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 250 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA



COMPOSIÇÃO: Composta pela associação das suspensões de *Clostridium botulinum* C e D inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia do Botulismo em bovinos, ovinos e caprinos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 5 mL. Ovinos e Caprinos: 2 mL. Vacinar os animais a partir dos 4 meses de idade, revacinando os primo-vacinados 4 semanas após a primeira vacinação. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.