

CARBESON®

CARRAPATICIDA E BERNICIDA
USO VETERINÁRIO – PULVERIZAÇÃO



FÓRMULA: Cada 100 mL contém:

Diclorvós (DDVP)	60,0 g
Clorfenvinfós	15,0 mL
Emulsionante e veículo* q.s.p.	100,0 mL

*alquil aril sulfonato de cálcio e xilol.

INDICAÇÕES:

CARBESON® combina a ação carrapaticida e berrnicida do Diclorvós+Clorfenvinfós. Com uma única aplicação, combate o carrapato (*Rhipicephalus microplus*) e berne (*Dermatobia hominis*) em bovinos.

MODO DE USAR:

Administrar por via tópica (externa). Preparar a diluição (1:400) no momento do uso, de acordo com tabela abaixo. Aplicar sobre o animal com auxílio de um pulverizador, 1 litro da mistura para cada 100 kg de peso vivo. Animais com peso \geq 500 kg, aplicar 5 litros da mistura, até que o corpo fique totalmente molhado, principalmente nas regiões mais infestadas pelos parasitas. Em gado leiteiro, aplicar após a ordenha.

Quantidade de CARBESON®	Quantidade de água
12,5 mL	5 litros
25,0 mL	10 litros
50,0 mL	20 litros
75,0 mL	30 litros
100,0 mL	40 litros
250,0 mL	100 litros

Alterações na posologia e modo de usar, a critério do Médico veterinário.

MODO DE PREPARO:

- 1 – Coloque um pouco de água potável num recipiente limpo;
- 2 – Medir a quantidade desejada de CARBESON®, cuidando que o produto não entre em contato com a pele e nem seja aspirado;
- 3 – Adicionar o produto ao recipiente, misturando com um bastão (pré-mistura);
- 4 – Completar o volume com água de acordo com tabela acima;
- 5 – Transfira a mistura para um pulverizador.

AGITAR BEM A MISTURA ANTES DE USAR

CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO:

Use protetor ocular: o produto é irritante para os olhos. Ocorrendo contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente. Use máscaras cobrindo o nariz e a boca; produto perigoso se inalado ou aspirado. Caso haja inalação ou aspiração, procure local arejado. Use luvas de borracha, macacão com mangas compridas, avental impermeável e botas. Produto irritante e/ou absorvível pela pele. Evitar contato do produto com pele e mucosas do corpo humano. No caso de acidentes ocasionais, lavar as partes afetadas várias vezes com água e sabão, e procurar atendimento Médico.

PRECAUÇÕES GERAIS:

Por conter organofosforados, não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Não utilize o produto após 24 horas de preparo. Não utilize equipamentos com vazamentos. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não manuseie o produto com as mãos desprotegidas. Não aplique o produto na presença de ventos fortes. Manter afastados na hora da aplicação crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas. Não guardar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos. Não contamine coleções de água de qualquer natureza. Descartar as embalagens vazias e restos de produto, bem como limpar os equipamentos ou recipientes usados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilize embalagens vazias.

ADVERTÊNCIAS:

Aplicar o produto após ordenha. Não utilize concentrações mais elevadas e nem com outro medicamento fosforado simultaneamente. Não é recomendável a aplicação deste produto em vacas no último mês de gestação. Não é aconselhável banhar animais debilitados, estressados ou sedentos. Evitar a aplicação deste produto nas horas de sol e calor intensos.

EFEITOS COLATERAIS:

Caso o produto cause intoxicação, os efeitos adversos mais comuns são náuseas, vômito, diarreia, micção, constrição de pupila, broncoconstrição, bradicardia, broncoespasmo, dispneia, paralisia respiratória, salivação, sudorese, depressão e tremores.

ANTÍDOTO:

Em caso de intoxicação em animais, aplicar por via subcutânea ou intramuscular 3 a 10 mL de Sulfato de Atropina a 1%. Em caso de intoxicação em humanos, chamar o Médico e aplicar 0,3 mL de Sulfato de Atropina à 1%, via subcutânea, repetindo a dose de hora em hora até o desaparecimento dos sintomas.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS:

ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO DEVE SER REALIZADO 10 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 02 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO. A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

APRESENTAÇÕES:

Frasco com 50 mL, acondicionado em display contendo 15 unidades.
Cartucho contendo frasco de 50 mL, acondicionado em caixas coletivas com 25 unidades.
Cartucho contendo frasco de 250 mL, acondicionado em caixas coletivas com 12 unidades.

CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto na embalagem original, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (entre 15 °C e 30°C), ao abrigo da luz solar e longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob o n° 1.444 em 22/09/81.

Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa - CRMV/BA 4.594.

Proprietário:

LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS

Feira de Santana/BA – CEP: 44010-665

Caixa. Postal 363

CNPJ: 34.362.558/0001-39

Licenciado no MAPA sob o n° BA-000143-0



SAC
0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br



Fabricantes:

**A3VET INDÚSTRIA COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA**

Estrada Vicinal Vito Gaia Puoli, S/N

Zona Rural, Descalvado/SP

CEP: 13690-000

CNPJ: 37.762.206/0001-69

Licenciado no MAPA sob o n° SP-005838-6

**VANSIL INDÚSTRIA COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA**

Rua João Augusto Cirelli, 640

Distrito Industrial, Descalvado/SP

CEP: 13690-000

CNPJ: 50.472.547/0001-68

Licenciado no MAPA sob o n° SP-000151-0

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SG2400