

SULFATO DE ATROPINA 1% USO VETERINÁRIO

Fórmula:

Cada 100 mL do produto contém:

Sulfato de Atropina.....1,0g

Veículo aquosoq.s.p.....100mL

Cada mL contém 10mg de Sulfato de Atropina.

INDICAÇÕES: SULFATO DE ATROPINA 1% é indicado como adjuvante pré-anestésico, para diminuir a salivação e a secreção do trato respiratório e para bloquear o reflexo vagal no coração durante a indução da anestesia e intubação (restabelecimento da frequência cardíaca e pressão arterial). Nas intoxicações por inseticidas organofosforados. Como estimulante cardíaco e respiratório. Como antiespasmódico nas contrações intestinais, uretrais e vesicais.

POSOLOGIA: Modo de usar e vias de administração

Verificar se a solução no interior do frasco está na forma líquida, livre de fragmentos ou de alguma substância que possa comprometer a eficácia e segurança do medicamento. SULFATO DE ATROPINA 1% é destinado à administração parenteral [via intramuscular (IM), intravenosa (IV) ou via subcutânea (SC)]. Na aplicação devem-se utilizar seringas e agulhas descartáveis.

BOVINOS: Como adjuvante pré-anestésico: 0,06 - 0,12 mg/Kg (0,006 mL - 0,012mL/Kg) IM. **Tratamento de intoxicações colinérgicas (organofosforados):** 0,5 mg/Kg (0,05mL/Kg) (administrar ¼ da dose IV (intravenoso) e o restante SC (subcutâneo) ou IM; pode repetir a dose a cada 3-4 horas, por 1-2 dias.

EQUINOS: Para tratamento de bradiarritmias devido ao aumento do tônus parassimpático: 0,01 - 0,02 mg/Kg (0,001mL - 0,002mL/Kg) IV (administrar ¼ da dose IV e o restante SC ou IM). **Como broncodilatador:** 5 mg (0,5mL) IV para 400 - 500 kg de animal. **Tratamento de intoxicações colinérgicas (organofosforados):** 0,22 mg/Kg (0,022mL/Kg) (administrar ¼ da dose IV e o restante SC ou IM).

SUÍNOS: Como adjuvante pré-anestésico: 0,04 mg/Kg (0,004mL/Kg) IM. **Tratamento de intoxicações colinérgicas (organofosforados):** 0,22 mg/Kg (0,022mL/Kg) (administrar ¼ da dose IV e o restante SC ou IM).

OVINOS E CAPRINOS: Como adjuvante pré-anestésico: 0,15 - 0,3 mg/Kg (0,015 - 0,03mL/Kg) IM.

Tratamento de intoxicações colinérgicas (organofosforados): 0,5 mg/Kg (0,05 mL/Kg) (administrar ¼ da dose IV (intravenoso) e o restante SC (subcutâneo) ou IM; pode repetir a dose a cada 3-4 horas, por 1-2 dias.

Alterações na posologia e modo de usar, a critério do Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES: A Atropina sistêmica deve ser usada com cautela em equinos, pois pode diminuir a motilidade intestinal e provocar cólicas em animais suscetíveis. O uso de Atropina em bovinos pode resultar em inapetência e estase ruminal, que pode persistir por vários dias. Animais sensíveis que não toleram qualquer alcaloide ou barbitúrico podem apresentar sensibilidade ao Sulfato de Atropina. Não se recomenda o uso de Atropina em animais prenhes ou em reprodução.

EFEITOS COLATERAIS: **Gastrintestinais:** Xerostomia, disfaça, obstipação, vômitos, sede, íleo paralítico e cólica (nos equinos); **Geniturinários:** Retenção urinária e impotência; **Oculares:** Visão distorcida, miíriase, ciclopegia, fotofobia e aumento da pressão intraocular; **Cardiovasculares:** Taquicardia sinusal (em doses mais elevadas), bradicardia (baixas doses de Atropina), hipertensão, hipotensão, arritmias, insuficiência cardíaca; **Respiratório:** Depressão respiratória; **Sistema Nervoso Central:** Fadiga, desorientação, convulsões, excitação. Altas doses podem ocasionar estimulação do Sistema Nervoso Central (inquietação e tremores); **Outros:** Supressão da lactação e diminuição da sudorese.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA BOVINOS, SUÍNOS, OVINOS, EQUINOS E CAPRINOS:

ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DOS ANIMAIS.

LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

APRESENTAÇÕES: Frascos de 5mL, 20mL e 100 mL.

CONSERVAÇÃO: Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, com temperatura entre 15°C a 30°C e longe do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 142 em 06/07/71.

Responsável Técnico: Dra. Priscila O. Falcão Paixão Costa - CRMV/BA nº 4.594.

Proprietário:



LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

Av. Banco do Nordeste, 22
Caixa Postal 363 - Centro Industrial do Subaé
Feira de Santana - Bahia
CEP: 44010-665

Fone: (75) 3612-4700
CNPJ: 34.362.558/0001-39
Licenciado no MAPA sob o nº BA-000143-0

Fabricante:
BIOFARM QUÍMICA E FARMACÉUTICA LTDA
Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710
Bairro Barreiro - Juazeiro/BA-CEP:
CEP: 14876-150
Fone/Fax: (16) 3209-3500
CNPJ: 02.256.581/0001-62
Licenciado no MAPA sob o nº SP-006465-3

SERVÍÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 703 1346 / E-mail: saoc@labovet.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA