

# VermKill Plus COMPRIMIDOS

VERMICIDA EM COMPRIMIDOS  
PARA CÃES E GATOS

Contém  
4 comprimidos  
de 940mg cada

USO VETERINÁRIO

## Fórmula:

Cada comprimido contém:

Pamoato de pirantel.....	144 mg
Praziquantel.....	50 mg
Fenbendazole.....	500 mg
Excipiente q.s.p.....	940 mg

**Indicações:** VERMKILL PLUS COMPRIMIDOS é um anti-helmíntico de amplo espectro na forma de comprimidos, indicado no combate dos cestódeos e nematódeos que infestam cães e gatos.

**Espectro Anti-Helmíntico:** *Trichuris vulpis*, *Trichinella spiralis*, *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*, *Echinococcus granulosos*, *Echinococcus multiloculares*, *Dipylidium caninum*, *Taenia avis*, *Taenia hidatigena*, *Taenia pisiformis*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides ssp*, *Hidatigena taeniaeformis*, *Joyeuxiella pasqualei*.

**Modo de Usar:** Via de administração: Via oral. Administrar VERMKILL PLUS COMPRIMIDOS na dosagem de 1 comprimido para cada 10kg de peso do animal, em dose única ou a critério do Médico Veterinário. O medicamento pode ou não ser misturado a alimentos, sendo preferível que o animal não esteja de estômago vazio.

**Efeitos Colaterais:** Doses excessivas induzem anorexia, vômitos, salivação, diarreia e letargia em menos de 5% dos animais que recebem o Praziquantel.

**Conservação:** Conservar em local fresco e seco (15°C a 30°C), fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**Precauções:** Venda sob prescrição de Médico Veterinário. Para um uso seguro, devem ser seguidas as recomendações de dose, uso do produto e indicação do médico veterinário. Caso o animal tenha pulgas, recomenda-se um tratamento adicional contra as mesmas, já que são hospedeiras intermediárias do *Dipylidium caninum*.

Utilização em fêmeas em qualquer fase de gestação ou lactação, e em filhotes, bem como em animais debilitados, somente com indicação do Médico Veterinário.

**Interações Medicamentosas:** Devido as suas propriedades colinérgicas o pirantel não deve ser administrado juntamente com outras drogas com propriedades colinérgicas (morantil ou levamisole) ou substâncias anticolinesterásicas (compostos organofosforados), porque podem levar a potencialização da sua toxicidade. O uso concomitante com dexametasona, reduz a biodisponibilidade do praziquantel.

**Responsável Técnico:** Priscila O. Falcão Paixão Costa - CRMV/BA 4.594

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 5.210 em 08/08/95.



LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

Av. Banco do Nordeste, 22  
Fone: (75) 3612-4700 - Fax: (75) 3612-4728  
Centro Industrial do Subaé - Feira de Santana - Bahia  
Caixa Postal 363 - CEP: 44010-665  
CNPJ: 34.362.558/0001-39  
Licenciado no MAPA sob o nº 000143-0

Fabricante:  
VANSIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

Rua João Augusto Cirelli, 640 - Distrito Industrial  
Descalvado - SP  
CNPJ: 50.472.547/0001-68  
Licenciado no MAPA sob o nº SP-000151-0

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
0800 703 1346  
sac@labovet.com.br