

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 7.274 em 28/03/00.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 50 mL, contendo 10 doses.
Partida, Fabricação
e Vencimento:
VIDE FRASCO

CLOSTRIMUNE - 8[®]
VACINA BACTERINA-TOXÓIDE POLIVALENTE
contra o Carbúnculo Sintomático, Gangrena
Gasosa, Enterotoxemia, Doença do Rim
Polposo, Hepatite Necrótica Infeciosa,
Morte Súbita e Tétano



Uso Veterinário
Injetável



LABOVET

Conteúdo: 50 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através das culturas de *Clostridium septicum*, *C. perfringens* B, C e D, *C. novyi* tipo B, *C. sordelli*, *C. tetani* e uma bactéria obtida através da cultura de *C. chauvoei*, inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.
INDICAÇÃO: Profilaxia do Carbúnculo Sintomático (Manqueira) dos bovinos, ovinos e caprinos, Gangrena Gasosa dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos, Enterotoxemia dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos (Enterite Hemorrágica), Desenteria dos cordeiros (Enterite Necrótica), Doença do Rim Polposo em bovinos e ovinos, Hepatite Necrótica dos bovinos e ovinos, Morte Súbita e Tétano em bovinos, ovinos, caprinos e suínos.
VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 5 mL. Vacinar os bezerros aos 4 meses de idade, revacinando os primoinoculados 4 semanas após a 1ª vacinação. Ovinos e Caprinos: 3 mL. Vacinar os cordeiros e cabritos aos 30 dias de idade e as ovelhas e cabras 30 a 40 dias antes da parição. Suínos: 3 mL. Vacinar as porcas dos 70 aos 80 dias de gestação e os leitões aos 60 dias. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.
PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, paralisados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local de aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.
CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob n° 7.274 em 28/03/00.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 100 mL, contendo 20 doses.
Partida, Fabricação
e Vencimento:
VIDE FRASCO

CLOSTRIMUNE - 8[®]
VACINA BACTERINA-TOXÓIDE POLIVALENTE
contra o Carbúnculo Sintomático, Gangrena
Gasosa, Enterotoxemia, Doença do Rim
Polposo, Hepatite Necrótica Infeciosa,
Morte Súbita e Tétano



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 100 mL



INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através das culturas de *Clostridium septicum*, *C. perfringens* B, C e D, *C. novyi* tipo B, *C. sordelli*, *C. tetani* e uma bactéria obtida através da cultura de *C. chauvoei*, inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia do Carbúnculo Sintomático (Manqueira) dos bovinos, ovinos e caprinos, Gangrena Gasosa dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos, Enterotoxemia dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos (Enterite Hemorrágica), Desintéria dos cordeiros (Enterite Necrótica), Doença do Rim Polposo em bovinos e ovinos, Hepatite Necrótica dos bovinos e ovinos, Morte Súbita e Tétano em bovinos, ovinos, caprinos e suínos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 5 mL. Vacinar os bezerros aos 4 meses de idade, revacinando os primovacinados 4 semanas após a 1ª vacinação. Ovinos e Caprinos: 3 mL. Vacinar os cordeiros e cabritos aos 30 dias de idade e as ovelhas e cabras 30 a 40 dias antes da parição. Suínos: 3 mL. Vacinar as porcas dos 70 aos 90 dias de gestação e os leitões aos 60 dias. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 7.274 em 28/03/00.
Responsável Técnico:
Dr^a Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 250 mL, contendo 50 doses.
Partida, Fabricação
e Vencimento:
VIDE FRASCO

CLOSTRIMUNE - 8[®]
VACINA BACTERINA-TOXÓIDE POLIVALENTE
contra o Carbúnculo Sintomático, Gangrena
Gasosa, Enterotoxemia, Doença do Rim
Polposo, Hepatite Necrótica Infecciosa,
Morte Súbita e Tétano



Uso Veterinário
Injetável



LABOVET

Conteúdo: 250 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através das culturas de *Clostridium septicum*, *C. perfringens* B, C e D, *C. novyi* tipo B, *C. sordelli*, *C. tetani* e uma bacterina obtida através da cultura de *C. chauvoei*, inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio-gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia do Carbúnculo Sintomático (Manqueira) dos bovinos, ovinos e caprinos, Gangrena Gasosa dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos, Enterotoxemia dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos (Enterite Hemorrágica), Desintéria dos cordeiros (Enterite Necrótica), Doença do Rim Polposo em bovinos e ovinos, Hepatite Necrótica dos bovinos e ovinos, Morte Súbita e Tétano em bovinos, ovinos, caprinos e suínos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia.

Bovinos: 5 mL. Vacinar os bezerros aos 4 meses de idade, revacinando os primovacinados 4 semanas após a 1^a vacinação. Ovinos e Caprinos: 3 mL. Vacinar os cordeiros e cabritos aos 30 dias de idade e as ovelhas e cabras 30 a 40 dias antes da partição. Suínos: 3 mL. Vacinar as porcas dos 70 aos 90 dias de gestação e os leitões aos 60 dias. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.