

FORMULA:

Cada 100 mL contém:

Gluconato de Cálcio	21g
Glicerofosfato de Cálcio	2g
Cloreto de Magnésio	5g
Dextrose	5g
Ácido de Bórico	2g
Veículo aquoso q.s.p	100mL

Produto licenciado no Ministério da agricultura
sob nº 4.160 em 14/12/92.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594

APRESENTAÇÕES:

Frascos com 200mL e 500mL.



**O USO OU APLICAÇÃO DESTE PRODUTO EM SERES
HUMANOS CAUSA GRAVES RISCOS À SAÚDE.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB
ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO**

Proprietário:**LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.**

Av. Banco do Nordeste, 22 - Cx. Postal - 363
Centro industrial do Subaé - Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665 Fone: (75) 3612-4700
CNPJ: 34.362.558/0001-39
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0

CÁLCIO GLICOSADO LABOVET

Uso Veterinário
Injetável

INDÚSTRIA BRASILEIRA

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA
BOVINOS, CAPRINOS, E OVINOS:**

**ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O
ABATE DE BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS TRATADOS.**

**LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O
CONSUMO DE LEITE DE BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS TRATADOS.**

EQUINOS E SUÍNOS:

**ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O
ABATE DE EQUINOS E SUÍNOS TRATADOS.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS
ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO
DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

INDICAÇÕES:

Hipocalcemia antes, durante e após o parto. Paresias,
paralisias e tetanias das pastagens, das viagens e do
parto. Estados alérgicos (eczemas, urticárias e choques
medicamentosos), intoxicações (BHC, DDT, canfeno,
clorados e outros). Acetonemias.

MODO DE USAR:

Uso injetável. Via de administração: Via intravenosa
(lentamente). Pode ser usado também pelas vias subcutânea
e intramuscular, dividindo a dose e injetando em
lugares diferentes.

Bovinos e Equinos adultos: 100 a 200 mL. Bezerros, Potros,
Ovinos, Caprinos e Suínos: 10 a 50 mL. Leitões e Caninos:
5 a 10 mL.

CONTRA-INDICAÇÕES:

-Em casos de fibrilação muscular ou com hipercalcemia.
Cálcio parenteral não pode ser administrado em animais
com níveis séricos normais de cálcio.
-Em animais diabéticos com problemas renais ou
cardíacos.

PRECAUÇÕES:

-Monitorar o animal durante a administração do produto.
-Sinais de intoxicação são evidenciados por bradicardia
(abaixo de 50 batimentos por minuto) e arritmia.

Antídoto:

-Usar Sulfato de Atropina de 8 a 10mg em uma única
dose.

**CONSERVAR EM LOCAL SECO E FRESCO, COM
TEMPERATURA ENTRE 15°C E 30°C, AO ABRIGO DA
LUZ SOLAR E LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS
E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Fabricante:**BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.**

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710 - Bairro Barreiro
Jaboticabal/SP - CEP: 14876- 150 Fone/Fax: (16) 3209-3500
CNPJ: 00.256.591/0001-62

Licenciado no MAPA sob nº SP-006465-3