

VERMKILL SUSPENSÃO

USO VETERINÁRIO- ORAL



FÓRMULA: Cada 100 mL contém:

Pamoato de Pirantel	1,44 g
Praziquantel	0,50 g
Veículo aquoso q.s.p.	100,0 mL

INDICAÇÕES:

Vermkill Suspensão é um vermífugo oral de amplo espectro indicado no combate aos cestódeos e nematódeos que acometem os cães.

Cestódeos: *Echinococcus granulosos*, *Echinococcus multiloculares*, *Dipylidium caninum*, *Taenia ovis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp*, *Hydatigena taeniaeformis*, *Joyeuxiella pasqualei*.

Nematódeos: *Toxocara canis*, *Toxocara leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*.

MODO DE USAR:

Administrar por via oral. Verifique o peso do animal para calcular a dose correta do tratamento. Agite bem o frasco e com ajuda da seringa dosadora, administrar o Vermkill Suspensão na dosagem de 1 mL para cada kg de peso, em dose única, diretamente na boca, sendo preferível que o animal não esteja de estômago vazio. O Vermkill Suspensão pode ser utilizado em filhotes a partir de 4 semanas. Utilizar a graduação indicativa da seringa dosadora.

PRECAUÇÕES:

Para um uso seguro, devem ser seguidas as recomendações de dose e uso do produto e indicações do Médico Veterinário. No caso de intoxicações ou reações hipersensíveis: tratamento sintomático. Caso o animal tenha pulgas, recomenda-se um tratamento adicional contra as mesmas, já que são hospedeiras intermediárias do *Dipylidium caninum*. A SEGURANÇA DO PRODUTO NÃO FOI AVALIADA EM FÊMEAS EM FASE DE GESTAÇÃO E LACTAÇÃO.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Devido as suas propriedades colinérgicas o pirantel não deve ser administrado juntamente com outras drogas com propriedades colinérgicas (morantil ou levamisole) ou substâncias anticolinérgicas (compostos organofosforados), porque pode levar a potencialização da sua toxicidade. O uso concomitante com dexametasona reduz a biodisponibilidade do praziquantel.

CONTRAINDICAÇÃO:

O pirantel não é recomendado para uso em animais gravemente debilitados, presumivelmente porque sua ação farmacológica é mais pronunciada nestes animais.

EFEITOS COLATERAIS:

Doses excessivas induzem anorexia, vômitos, salivação, diarreia e letargia em menos de 5% dos animais que recebem o praziquantel.

APRESENTAÇÃO:

Cartucho contendo frasco com 20mL, acondicionado em caixas coletivas com 24 unidades. Acompanha seringa dosadora de 3mL.

CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto na embalagem original, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), ao abrigo da luz solar e longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob nº BA 000143-0.000026 em 18/10/01.

Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa - CRMV/BA 4.594

Proprietário:

LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS

Feira de Santana/BA – CEP: 44010-665

Caixa Postal 363

CNPJ: 34.362.558/0001-39

Licenciado no MAPA sob o nº BA-000143-0

SAC

0800 703 1346

sac@labovet.com.br

www.labovet.com.br

Fabricante:

VANSIL COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA

Rua João Augusto Cirelli, 640

Distrito Industrial, Descalvado/SP

CEP: 13690-000

CNPJ: 50.472.547/0001-68

Licenciado no MAPA sob o nº SP-000151-0

INDÚSTRIA BRASILEIRA