

VERMKILL® PLUS SUSPENSÃO

USO VETERINÁRIO – ORAL



FÓRMULA: Cada 100 mL contém:

Pamoato de pirantel.....	1,44 g
Praziquantel.....	0,50 g
Fenbendazole.....	5,00 g
Veículo q.s.p.....	100 mL

INDICAÇÕES:

VERMKILL® PLUS SUSPENSÃO é um vermífugo oral de amplo espectro indicado no combate aos seguintes nematódeos e cestódeos que acometem os cães e gatos: *Trichuris vulpis*, *Trichinella spiralis*, *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxocara leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia ovis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp*, *Hydatigera taeniaformis* e *Joyeuxiella pasqualei*.

MODO DE USAR:

Administrar VERMKILL® PLUS SUSPENSÃO por via oral, na dose de 1 mL para cada Kg de peso, em dose única ou a critério do Médico Veterinário. O medicamento pode ou não ser misturado a alimentos, sendo preferível que o animal não esteja de estômago vazio. Utilizar a graduação indicativa do dosador.

PRECAUÇÕES:

VERMKILL® PLUS SUSPENSÃO não apresenta contra-indicações, efeitos biológicos indesejados, incompatibilidades e efeitos colaterais quando utilizado segundo as recomendações. VERMKILL® PLUS SUSPENSÃO pode ser utilizado por fêmeas em qualquer fase de gestação ou lactação e em filhotes a partir de 4 semanas. Para um uso seguro, devem ser seguidas as recomendações de dose e uso do produto e indicações do Médico Veterinário. No caso de intoxicações ou reações hipersensíveis: tratamento sintomático. Caso o animal tenha pulgas, recomenda-se um tratamento adicional contra as mesmas, já que são hospedeiras intermediárias do *Dipylidium caninum*.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Devido as suas propriedades colinérgicas o pirantel não deve ser administrado juntamente com outras drogas com propriedades colinérgicas (morantil ou levamisole) ou substâncias anticolinesterásicas (compostos organofosforados), porque podem levar a potencialização da sua toxicidade. O uso concomitante com dexametasona, reduz a biodisponibilidade do praziquantel.

CONTRAINDICAÇÕES:

O pirantel não é recomendado para uso em animais gravemente debilitados, presumivelmente porque sua ação farmacológica é mais pronunciado nesses animais.

EFEITOS COLATERAIS:

Doses excessivas induzem anorexia, vômitos, salivação, diarreia e letargia em menos de 5% dos animais que recebem o praziquantel.

APRESENTAÇÕES:

Cartucho contendo frasco de 20 mL, acondicionados em caixas coletivas com 24 unidades. Acompanha seringa dosadora de 3 mL.

CONSERVAÇÃO:

Conservar em local seco e fresco, com temperatura entre 15°C e 30°, ao abrigo dos raios solares e longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.960 em 18/10/01.

Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa - CRMV/BA 4.594.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Proprietário:

LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS

Feira de Santana/BA – CEP: 44010-665

Caixa. Postal 363

CNPJ: 34.362.558/0001-39

Licenciado no MAPA sob o nº BA-000143-0

SAC

0800 703 1346

sac@labovet.com.br

www.labovet.com.br

Fabricante:

VANSIL INDÚSTRIA COMÉRCIO

E REPRESENTAÇÕES LTDA

Rua João Augusto Cirelli, 640

Distrito Industrial, Descalvado/SP

CEP: 13690-000

CNPJ: 50.472.547/0001-68

Licenciado no MAPA sob o nº SP-000151-0