

VERMKILL PLUS SUSPENSÃO

USO VETERINÁRIO - ORAL

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

| | |
|--------------------------|--------|
| Pamoato de pirantel..... | 1,44g |
| Praziquantel..... | 0,50g |
| Fenbendazole..... | 5,00g |
| Veículo q.s.p..... | 100 mL |

INDICAÇÕES:

VERMKILL PLUS SUSPENSÃO é um vermífugo oral de amplo espectro indicado no combate aos seguintes nematódeos e cestódeos que acometem os cães e gatos: *Trichuris vulpis*, *Trichinella spiralis*, *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxocara leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia ovis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp*, *Hydatigera taeniaformis* e *Joyeuxiella pasqualei*.

MODO DE USAR:

Administrar VERMKILL PLUS SUSPENSÃO por via oral, na dose de 1 mL para cada Kg de peso, em dose única ou a critério do Médico Veterinário. O medicamento pode ou não ser misturado a alimentos, sendo preferível que o animal não esteja de estômago vazio. Utilizar a graduação indicativa do dosador.

CONTRA-INDICAÇÕES:

O pirantel não é recomendado para uso em animais gravemente debilitados, presumivelmente porque sua ação farmacológica é mais pronunciado nesses animais.

PRECAUÇÕES:

VERMKILL PLUS SUSPENSÃO não apresenta contra-indicações, efeitos biológicos indesejados, incompatibilidades e efeitos colaterais quando utilizado segundo as recomendações. VERMKILL PLUS SUSPENSÃO pode ser utilizado por fêmeas em qualquer fase de gestação ou lactação e em filhotes a partir de 4 semanas. Para um uso seguro, devem ser seguidas as recomendações de dose e uso do produto e indicações do Médico Veterinário. No caso de intoxicações ou reações hipersensíveis: tratamento sintomático. Caso o animal tenha pulgas, recomenda-se um tratamento adicional contra as mesmas, já que são hospedeiras intermediárias do *Dipylidium caninum*.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Devido as suas propriedades colinérgicas o pirantel não deve ser administrado juntamente com outras drogas com propriedades colinérgicas (morantil ou levamisole) ou substâncias anticolinérgicas (compostos organofosforados), porque podem levar a potencialização da sua toxicidade. O uso concomitante com dexametasona, reduz a biodisponibilidade do praziquantel.

EFEITOS COLATERAIS:

Doses excessivas induzem anorexia, vômitos, salivação, diarreia e letargia em menos de 5% dos animais que recebem o praziquantel.

CONSERVAÇÃO:

Conservar em local seco e fresco, com temperatura entre 15°C e 30°, ao abrigo dos raios solares e longe do alcance de crianças e animais domésticos.

APRESENTAÇÕES:

Frascos com 20mL, 50mL e 100mL. Acompanha seringa dosadora de 3mL.

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.960 em 18/10/01.

Responsável Técnico: Dr^a Priscila O. Falcão Paixão Costa - CRMV/BA 4.594

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.



LABOV PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 22
Fone: (75) 3612-4700 - Fax: (75) 3612-4728
Centro Industrial do Subaé - Feira de Santana - Bahia
Caixa Postal 363 - CEP: 44010-665
CNPJ: 34.362.558/0001-39
Licenciado no MAPA sob o nº 000143-0

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 703 1346 / E-mail: sac@labovet.com.br

Fabricante:

LEVAS LEITE S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS
Rua Benjamin Constant, 1637
Polotas, RS, Brasil
Licenciado no MAPA sob nº RS-06037-2
CNPJ: 92.191.658/0001-90

INDÚSTRIA BRASILEIRA