Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346 sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 7.187 em 06/01/00.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentação:
Frasco com 50 mL, contendo 50 doses.
PART.:
FABR.:
VENC.:

7 897817 202030

VACINA 1002
VIVA ATENUADA
Contra a Linfadenite Caseosa dos Caprinos e Ovinos

Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 50 mL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

TECNOLOGIA EBDA

COMPOSIÇÃO: Composta por suspensão do *Corynebacterium pseudoturberculosis* cepa 1002 viva atenuada. Suspensão final em solução salina fosfatada.
INDICAÇÃO: Profilaxia da Linfadenite Caseosa dos ovinos e caprinos (Mal do Caroço ou Falsa Tuberculose).
VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar, por via subcutânea, em cabritos e borregos ao desmame, observando os cuidados usuais de assepsia. Dose: 1mL. Repetir após 3 semanas. Em animais adultos não vacinados, vacinar com duas doses, em um intervalo de 21 à 30 dias. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade do Médico Veterinário, principalmente em caso de surto.
PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento da resposta imune após a vacinação / Incinerar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.
CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346 sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 7.187 em 06/01/00.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentação:
Frasco com 100 mL, contendo 100 doses.
PART.:
FABR.:
VENC.:

VACINA 1002
VIVA ATENUADA
Contra a Linfadenite Caseosa dos Caprinos e Ovinos

Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 100 mL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

TECNOLOGIA
EBDA

COMPOSIÇÃO: Composta por suspensão do *Corynebacterium pseudoturberculosis* cepa 1002 viva atenuada. Suspensão final em solução salina fosfatada.
INDICAÇÃO: Profilaxia da Linfadenite Caseosa dos ovinos e caprinos (Mal do Caroço ou Falsa Tuberculose).
VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar, por via subcutânea, em cabritos e borregos ao desmame, observando os cuidados usuais de assepsia. Dose: 1mL. Repetir após 3 semanas. Em animais adultos não vacinados, vacinar com duas doses, em um intervalo de 21 à 30 dias. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade do Médico Veterinário, principalmente em caso de surto.
PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento da resposta imune após a vacinação / Incinerar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.
CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346 sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 7.187 em 06/01/00.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentação:
Frasco com 250 mL, contendo 250 doses.
PART.:
FABR.:
VENC.:

VACINA 1002
VIVA ATENUADA
Contra a Linfadenite Caseosa dos Caprinos e Ovinos



Uso Veterinário
Injetável

7897817202559

LABOVET

Conteúdo: 250 mL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

TECNOLOGIA EBDA

COMPOSIÇÃO: Composta por suspensão do *Corynebacterium pseudoturberculosis* cepa 1002 viva atenuada. Suspensão final em solução salina fosfatada.
INDICAÇÃO: Profilaxia da Linfadenite Caseosa dos ovinos e caprinos (Mal do Caroço ou Falsa Tuberculose).
VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar, por via subcutânea, em cabritos e borregos ao desmame, observando os cuidados usuais de assepsia. Dose: 1mL. Repetir após 3 semanas. Em animais adultos não vacinados, vacinar com duas doses, em um intervalo de 21 à 30 dias. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade do Médico Veterinário, principalmente em caso de surto.
PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento da resposta imune após a vacinação / Incinerar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.
CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.