

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob n° 3.791 em 26/08/91.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 50 mL, contendo 25 doses,
acondicionados em displays contendo
25 unidades.
Partida, Fabricação
e Vencimento: VIDE FRASCO

**VACINA
MONOVALENTE
CONTRA O CARBÚNCULO
SINTOMÁTICO**



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 50 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA



COMPOSIÇÃO: Constituída por cultura de *Clostridium chauvoei*, inativada pelo formol e adsorvida pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia do Carbúnculo Sintomático dos bovinos, ovinos e caprinos (Peste da Manqueira).

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 2 mL. Vacinar os bezeros aos 4 meses de idade. Revacinar ao desmame. Ovinos e caprinos: 2 mL. Vacinar os cordeiros ou cabritos aos 30 dias e as ovelhas ou cabras, 30 a 40 dias antes da partição. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, em temperatura ambiente, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 3.791 em 26/08/91.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Fracos com 100 mL, contendo 50 doses,
acondicionados em displays contendo
25 unidades.
Partida, Fabricação
e Vencimento: VIDE FRASCO

**VACINA
MONOVALENTE
CONTRA O CARBÚNCULO
SINTOMÁTICO**



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 100 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA



COMPOSIÇÃO: Constituída por cultura de *Clostridium chauvoei*, inativada pelo formol e adsorvida pelo hidróxido de alumínio gel.
INDICAÇÃO: Profilaxia do Carbúnculo Sintomático dos bovinos, ovinos e caprinos (Peste da Manqueira).
VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 2 mL. Vacinar os bezerras aos 4 meses de idade. Revacinar ao desmame. Ovinos e caprinos: 2 mL. Vacinar os cordeiros ou cabritos aos 30 dias e as ovelhas ou cabras, 30 a 40 dias antes da parição. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.
PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.
CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, em temperatura ambiente, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 3.791 em 26/08/91.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 250 mL, contendo 125 doses,
acondicionados em displays contendo
25 unidades.
Partida, Fabricação
e Vencimento: VIDE FRASCO

**VACINA
MONOVALENTE
CONTRA O CARBÚNCULO
SINTOMÁTICO**



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 250 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA



COMPOSIÇÃO: Constituída por cultura de *Clostridium chauvoei*, inativada pelo formol e adsorvida pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia do Carbúnculo Sintomático dos bovinos, ovinos e caprinos (Peste da Manqueira).

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 2 mL. Vacinar os bezerros aos 4 meses de idade. Revacinar ao desmame. Ovinos e caprinos: 2 mL. Vacinar os cordeiros ou cabritos aos 30 dias e as ovelhas ou cabras, 30 a 40 dias antes da parição. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti- inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, em temperatura ambiente, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.