

OCTOCELL - VAC[®]

Vacina combinada contra a Cinomose, Hepatite infecciosa, Adenovirose, Parvovirose, Parainfluenza, Coronavírose, Leptospirose (*L. canicola* e *L. icterohaemorrhagiae*).

USO VETERINÁRIO - INJETÁVEL

COMPOSIÇÃO:

A fração liofilizada é composta de suspensões virais vivas atenuadas de Cinomose, Adenovírus tipo 2, Parvovírus e Parainfluenza Canina. A fração líquida é composta pela associação da suspensão viral inativada de Coronavírus e suspensões bacterianas inativadas de *Leptospira canicola* e de *L. icterohaemorrhagiae*.

INDICAÇÕES:

Contra a Cinomose, Hepatite infecciosa canina e doença respiratória, causadas pelo Adenovírus tipo 2, Parvovirose, Parainfluenza, Coronavírose e infecções causadas pela *Leptospira canicola* e *L. icterohaemorrhagiae*.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR:

Administrar por via intramuscular ou subcutânea. Se subcutânea, as regiões preferidas são no flanco ou dorso e se intramuscular, no músculo externo da coxa (glúteo). Diluir a fração liofilizada com a fração líquida da vacina, no momento do uso, agitando até a total dissolução da pastilha.

Dose: 1mL.

Preparação do produto:

1. Usar seringa e agulha estéril (calibre 25 x 7).
2. Aspirar todo o conteúdo da fração líquida.
3. Reconstituir a fração liofilizada.
4. Agitar até obter a completa reconstituição da pastilha.
5. Agitar a vacina antes do uso.

ESQUEMA DE VACINAÇÕES RECOMENDADAS:

Vacinação primária: Filhotes

Sabe-se que a presença de anticorpos da mãe interfere no desenvolvimento da imunidade ativa, por isso a vacinação deverá ser repetida conforme quadro abaixo:

1ª Dose	6 semanas
2ª Dose	9 semanas
3ª Dose	12 semanas
4ª Dose	16 semanas

O ciclo de proteção oferecido pela vacina estará concluído 21 dias após a 3ª dose vacinal, porém recomenda-se a 4ª dose como forma de reforço vacinal, o que irá aumentar em muito a produção de anticorpos em zonas endêmicas, porém quem deverá elaborar o melhor esquema é o Médico Veterinário que conhece as condições físicas e ambientais do animal.

Vacinação Sequencial: Adultos

Revacinar anualmente com dose única de 1mL.

PRECAUÇÕES:

- Agitar antes e durante o uso.
- Usar seringas e agulhas novas, descartáveis e estéreis.
- Desinfetar o local da aplicação.
- A vacinação deve ser precedida de um exame clínico minucioso por um Médico Veterinário.
- Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse.
- Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias.
- Incinerar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso.
- Verificar o prazo de validade do produto.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento da resposta imune após a vacinação.
- Não utilizar qualquer tipo de substância química que possa inativar o produto.
- O vacinador deverá lavar e desinfetar as mãos após o trabalho.
- No caso de ocorrência de reação anafilática, aplicar imediatamente adrenalina 1:1000.
- Utilizar somente o diluente fornecido pelo fabricante da vacina.

CONSERVAÇÃO:

Conservar em temperatura de 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR.

APRESENTAÇÃO:

Caixas Isotérmicas contendo 15 frascos com 1 dose da fração liofilizada e 15 frascos com 1mL da fração diluente para reconstituição.

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 7.095 em 03/10/99.

Responsável Técnico: Dr.^a Priscila O. Falcão Paixão Costa CRMV/BA 4.594

Proprietário e Fabricante:



LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

Av. Banco do Nordeste, nº 22
Caixa Postal: 363 - Centro Industrial do Subeá
Feira de Santana - BA
CEP: 44010-665
Fone: (75) 3612-4700
CNPJ: 34.362.558/0001-39
Licenciado no MAPA sob o nº BA - 000143-0
INDÚSTRIA BRASILEIRA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 703 1346 e-mail: sac@labovet.com.br