

Proprietário e Fabricante:  
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA  
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS  
Feira de Santana/BA  
CEP: 44010-695  
Caixa Postal 363  
CNPJ: 34.362.558/0001-39  
SNC 0800 703 1346  
sac@labovet.com.br  
www.labovet.com.br  
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0  
Produto licenciado no Ministério da  
Agricultura sob nº 3.731 em 16/05/91.  
Responsável Técnico:  
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa  
CRM/VBA 4.594  
Apresentações:  
Frascos com 20 mL, contendo 10 doses.  
PART.:  
FABR.:  
VENC.:

### VACINA CONTRA O PARATIFO DOS BEZERROS LABOVET



Uso Veterinário  
Hortifrut

LABOVET

Conteúdo: 20 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Composta pelas culturas de *Salmonella dublin* e *Salmonella typhimurium*, inativadas pelo formal, adicionadas em solução tamponada saponificada.  
INDICAÇÃO: Profilaxia do Paratifo ou Diarréia dos Bezerros.  
VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bezerros: 2 mL. Vacinar dos 15 aos 30 dias de idade. Vacas em gestação: 5 mL. Vacinar 30 dias antes do parto. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.  
PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local de aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.  
CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:  
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA  
Av. Banco do Nordeste,455 - CIS  
Feira de Santana/BA  
CEP: 44010-665  
Caixa Postal 363  
CNPJ: 34.362.558/0001-39  
SAC 0800 703 1346  
sac@labovet.com.br  
www.labovet.com.br  
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0  
Produto licenciado no Ministério da  
Agricultura sob nº 3.731 em 16/05/91.  
Responsável Técnico:  
Drº Priscila O. Falcão Paixão Costa  
CRMV/BA 4.594  
Apresentações:  
Frascos com 50 mL, contendo 25 doses.  
PART.:  
FABR.:  
VENC.:

## VACINA CONTRA O PARATIFO DOS BEZERROS LABOVET



Uso Veterinário  
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 50 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Composta pelas culturas de *Salmonella dublin* e *Salmonella typhimurium*, inativadas pelo formol, adicionadas em salina tamponada saponificada.

INDICAÇÃO: Profilaxia do Paratifo ou Diarreia dos Bezerros.  
VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bezerros: 2 mL. Vacinar dos 15 aos 30 dias de idade. Vacas em gestação: 5 mL. Vacinar 30 dias antes do parto. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

