

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346 sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 5.882 em 25/02/97.
Responsável Técnico:
Dr^a Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentação:
Frasco com 50 mL, contendo 16 doses.
PART.:
FABR.:
VENC.:

**VACINA CONTRA
A PASTEURELOSE
E SALMONULOSE
BOVINA LABOVET**



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 50 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Constituída por cultivos de *Pasteurella multocida*, *P. haemolytica*, *Salmonella dublin* e *S. typhimurium*, inativados pelo formol e adsorvidos pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia da Pasteurelose e Salmonulose dos bovinos (septicemia hemorrágica e pneumoenterite).

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR:

Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 3 mL. Animais primovacinados deverão receber uma 1ª dose a partir do 3º mês de vida e uma 2ª dose de reforço 15 a 20 dias após a primeira. Animais de cria deverão ser vacinados no tempo final da gestação (1ª dose) e revacinados (2ª dose) 15 a 20 dias após a primeira dose. Seguir o esquema de vacinação revacinando todos os animais de 6 em 6 meses. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.



Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346 sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob n° 5.882 em 25/02/97.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentação:
Frasco com 100 mL, contendo 33 doses.
PART.:
FABR.:
VENC.:

**VACINA CONTRA
A PASTEURELOSE
E SALMONÉLOSE
BOVINA LABOVET**



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 100 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA



7 1897817120226

COMPOSIÇÃO: Constituída por cultivos de *Pasteurella multocida*, *P. haemolytica*, *Salmonella dublin* e *S. typhimurium*, inativados pelo formol e adsorvidos pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia da Pasteurelose e Salmonelose dos bovinos (septicemia hemorrágica e pneumoenterite).

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 3 mL. Animais primovacinados deverão receber uma 1ª dose a partir do 3º mês de vida e uma 2ª dose de reforço 15 a 20 dias após a primeira. Animais de cria deverão ser vacinados no terço final da gestação (1ª dose) e revacinados (2ª dose) 15 a 20 dias após a primeira dose. Seguir o esquema de vacinação revacinando todos os animais de 6 em 6 meses. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346 sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 5.882 em 25/02/97.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentação:
Frasco com 200 mL, contendo 66 doses.
PART.:
FABR.:
VENC.:

**VACINA CONTRA
A PASTEURELOSE
E SALMONELOSE
BOVINA LABOVET**



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 200 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA



COMPOSIÇÃO: Constituída por cultivos de *Pasteurella multocida*, *P. haemolytica*, *Salmonella dublin* e *S. typhimurium*, inativados pelo formol e adsorvidos pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia da Pasteurelose e Salmonelose dos bovinos (septicemia hemorrágica e pneumoenterite).

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 3 mL. Animais primovacinaados deverão receber uma 1ª dose a partir do 3º mês de vida e uma 2ª dose de reforço 15 a 20 dias após a primeira. Animais de cria deverão ser vacinados no terço final da gestação (1ª dose) e revacinados (2ª dose) 15 a 20 dias após a primeira dose. Seguir o esquema de vacinação revacinando todos os animais de 6 em 6 meses. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana/BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346 sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 5.882 em 25/02/97.
Responsável Técnico:
Dr^a Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentação: Frasco com 250 mL,
contendo 83 doses.
PART.:
FABR.:
VENC.:

VACINA CONTRA A PASTEURELOSE E SALMONELOSE BOVINA LABOVET



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 250 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA



COMPOSIÇÃO: Constituída por cultivos de *Pasteurella multocida*, *P. haemolytica*, *Salmonella dublin* e *S. typhimurium*, inativados pelo formol e adsorvidos pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia da Pasteurelose e Salmonelose dos bovinos (septicemia hemorrágica e pneumoenterite).

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 3 mL. Animais primovacinações deverão receber uma 1ª dose a partir do 3º mês de vida e uma 2ª dose de reforço 15 a 20 dias após a primeira. Animais de cria deverão ser vacinados no terço final da gestação (1ª dose) e revacinados (2ª dose) 15 a 20 dias após a primeira dose. Seguir o esquema de vacinação revacinando todos os animais de 6 em 6 meses. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.