VACINA CONTRA A PASTEURELOSE E Av. Banco do Nordeste, nº 22 SALMONELOSE CIS - Feira de Santana / BA **BOVINA LABOVET** CNPJ 34.362.558/0001-39 Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob o n° 5.882 em 25/02/97. Dra Priscila O. Falcão Paixão Costa Frasco com 50mL, 100mL, INDÚSTRIA BRASII FIRA

Proprietário e Fabricante:

LABOVET PRODUTOS

VETERINÁRIOS I TDA

CEP: 44010-665

Caixa Postal 363

nº BA-000143-0

Tel: (75) 3612-4700

SAC 0800 703 1346

sac@labovet.com.br

Responsável Técnico:

CRMV/BA 4.594.

200mL e 250mL.

Apresentação:

Licenciado no MAPA sob

deverão receber uma primeira dose a partir do 3º mês de vida e uma Segunda dose de reforco 15 à 20 dias após a primeira. Animais de cria deverão ser vacinados no terco final da gestação (1ª dose) e revacinados (2ª dose) 15 a 20 dias após a primeira dose. Seguir o esquema de vacinação revacinando todos os animais de 6 em 6 meses

COMPOSICÃO: Constituída por cultivos de Pasteurella

multocida, P. haemolytica, Salmonella dublin e S.

INDICAÇÃO: Indicada na imunização ativa contra a

Pasteurelose e Salmonelose dos bovinos (septicema

DOSES. VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:

Administrar pela via subcutânea, observando-se

os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 3 mL.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO: Animais primovacinados

typhimurium, obtidos em meios especiais.

hemorrágica e pneumoenterite).

CUIDADOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS: Agite

antes de usar / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse, e cabras e ovelhas em gestação / Usar seringas e agulhas estéreis / Manter fora do alcance de criancas e animais domésticos / Conservar a temperatura de 2ºC a 8ºC / Não congelar / Não aproveitar frascos após o uso.