

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CJS
Feira de Santana / BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob n° 3.724 em 13/05/91.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 50 mL, contendo 16 doses.
Partida, Fabricação
e Vencimento:
VIDE FRASCO

POLY-HEPTA®
VACINA POLIVALENTE
contra o Carbúnculo Sintomático,
Gangrena Gasosa e Enterotoxemia



Uso Veterinário
Injetável

LABOVET

Conteúdo: 50 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através de culturas de *Clostridium septicum*, *C. perfringens* B, C e D, *C. novyi* e *C. sordellii* e uma bactéria obtida através da cultura de *C. chauvoei*, inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÕES: Profilaxia do Carbúnculo Sintomático (Manqueira) dos bovinos, ovinos e caprinos, Gangrena Gasosa dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos, Hepatite Necrótica dos bovinos e ovinos, Disenteria dos cordeiros (Enterite Necrótica), Enterotoxemia dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos (Enterite Hemorrágica), Enterotoxemia em bovinos e ovinos (Rim Polposo) e Morte Súbita em bovinos, ovinos, caprinos e suínos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 3 mL. Vacinar os bezerros aos 4 meses de idade. Revacinar ao desmame. Ovinos e Caprinos: 2 mL. Vacinar os cordeiros e cabritos aos 30 dias de idade e as ovelhas e cabras 30 a 40 dias antes da partição. Suínos: 2 mL. Vacinar as porcas dos 70 aos 90 dias de gestação e os leitões aos 60 dias. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, submetidos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local de aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:

LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS

Feira de Santana / BA

CEP: 44010-665

Caixa Postal 363

CNPJ: 34.362.558/0001-39

SAC 0800 703 1346

sac@labovet.com.br

www.labovet.com.br

Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0

Produto licenciado no Ministério da

Agricultura sob nº 3.724 em 13/05/91.

Responsável Técnico:

Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa

CRMV/BA 4.594

Apresentações:

Frascos com 100 mL, contendo 33 doses.

Partida, Fabricação

e Vencimento:

VIDE FRASCO

POLY-HEPTA®

VACINA POLIVALENTE
contra o Carbúnculo Sintomático,
Gangrena Gasosa e Enterotoxemia



Uso Veterinário
Injetável



LABOVET

Conteúdo: 100 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através de culturas de *Clostridium septicum*, *C. perfringens* B, C e D, *C. novyi* e *C. sordelli* e uma bacterina obtida através da cultura de *C. chauvoei*, inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÕES: Profilaxia do Carbúnculo Sintomático (Manqueira) dos bovinos, ovinos e caprinos, Gangrena Gasosa dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos, Hepatite Necrótica dos bovinos e ovinos, Desenteria dos cordeiros (Enterite Necrótica), Enterotoxemia dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos (Enterite Hemorrágica), Enterotoxemia em bovinos e ovinos (Rim Polposo) e Morte Súbita em bovinos, ovinos, caprinos e suínos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 3 mL. Vacinar os bezerros aos 4 meses de idade. Revacinar ao desmame. Ovinos e Caprinos: 2 mL. Vacinar os cordeiros e cabritos aos 30 dias de idade e as ovelhas e cabras 30 a 40 dias antes da partição. Suínos: 2 mL. Vacinar as porcas dos 70 aos 90 dias de gestação e os leitões aos 60 dias. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana / BA
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ: 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da
Agricultura sob nº 3.724 em 13/05/91.
Responsável Técnico:
Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações:
Frascos com 250 mL, contendo 83 doses.
Partida, Fabricação
e Vencimento:
VIDE FRASCO

POLY-HEPTA®

VACINA POLIVALENTE
contra o Carbúnculo Sintomático,
Gangrena Gasosa e Enterotoxemia



Uso Veterinário
Injetável



LABOVET

Conteúdo: 250 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através de culturas de *Clostridium septicum*, *C. perfringens* B, C e D, *C. novyi* e *C. sordelli* e uma bacterina obtida através da cultura de *C. chauvoei*, inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÕES: Profilaxia do Carbúnculo Sintomático (Manqueira) dos bovinos, ovinos e caprinos, Gangrena Gasosa dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos, Hepatite Necrótica dos bovinos e ovinos, Desintéria dos cordeiros (Enterite Necrótica), Enterotoxemia dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos (Enterite Hemorrágica), Enterotoxemia em bovinos e ovinos (Rim Polposo) e Morte Súbita em bovinos, ovinos, caprinos e suínos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 3 mL. Vacinar os bezerras aos 4 meses de idade. Revacinar ao desmame. Ovinos e Caprinos: 2 mL. Vacinar os cordeiros e cabritos aos 30 dias de idade e as ovelhas e cabras 30 a 40 dias antes da parição. Suínos: 2 mL. Vacinar as porcas dos 70 aos 90 dias de gestação e os leitões aos 60 dias. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.