

Proprietário e Fabricante:

LABOVET PRODUTOS

VETERINÁRIOS LTDA

Av. Banco do Nordeste, n° 22

CIS - Feira de Santana / BA

CEP: 44010-665

Caixa Postal 363

Tel: (75) 3612-4700

CNPJ 34.362.558/0001-39

Licenciado no MAPA sob

n° BA-000143-0

SAC 0800 703 1346

sac@labovet.com.br

Produto licenciado no Ministério da

Agricultura sob o n° 3.724 em 13/05/91.

Responsável Técnico:

Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa

CRMV/BA 4.594.


Apresentação:

Frasco com 50mL, 100mL e 250ml.

# POLY-HEPTA®

VACINA POLIVALENTE

Contra o Carbúnculo Sintomático,  
Gangrena Gasosa e Enterotoxemia



Uso Veterinário  
Injetável

LABOVET

INDÚSTRIA BRASILEIRA

**COMPOSIÇÃO:** Produzida a partir de toxinas e uma Bacterina obtidas através de culturas de *C. chauvoei*, *C. septicum*, *C. perfringens* B, C e D, *C. novyi* e *C. sordelli* inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel (Adjuvante).

**INDICAÇÃO:** Profilaxia do Carbúnculo Sintomático (Manqueira) dos bovinos, ovinos e caprinos, Gangrena Gasosa dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos, Hepatite Necrótica dos bovinos e ovinos, Desintéria dos cordeiros (Enterite Necrótica), Enterotoxemia dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos (Enterite Hemorrágica), e Enterotoxemia em bovinos e ovinos (Rim Polposo).

**DOSES, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:** Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 3 mL. Vacinar os bezeros aos 4 meses de idade. Revacinar ao desmame. Ovinos e Caprinos: 2 mL. Vacinar os cordeiros e cabritos aos 30 dias de idade, repetir após 4 semanas. Suínos: 2 mL. Vacinar as porcas dos 70 aos 90 dias de gestação, e os leitões aos 60 dias, repetir após 4 semanas da 1ª vacinação. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente.

**CUIDADOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS:** Agitar antes de usar / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse. Não vacinar ovelhas e cabras em gestação / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento da resposta imune após a vacinação / Conservar em temperatura de 2°C a 8°C Não congelar / Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados a critério do Médico Veterinário / Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos / Não aproveitar frascos após o uso.