

PART.:  
FABR.:  
VENC.:

**Fórmula: Cada 100mL contém:**

Digluconato de Clorexidina à 20% ..... 1 g  
Cloreto de Cetrimônio à 25%..... 0,5 g  
Veículo emoliente q.s.p. .... 100 mL

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 4.749 em 03/08/94.

**Responsável Técnico:** Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa - CRMV/BA 4.594

**Apresentação:** Frascos com 5L, acondicionados em caixas coletivas contendo 4 frascos.

**Conservação:** Conservar o produto na embalagem original, em local seco e fresco, com temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz solar e longe do alcance de crianças e animais domésticos. Não reutilize a embalagem vazia.

Proprietário:  
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA  
Av. Banco do Nordeste, 22  
Centro Industrial do Subaé, Feira de Santana / BA  
Caixa Postal 363 Tel.: 75 3612-4700  
CEP: 44010-665 CNPJ: 34.362.558/0001-39  
Licenciado no MAPA sob o n° BA-000143-0

Fabricante:  
LEIVAS LEITE S.A  
Indústrias Químicas e Biológicas  
Rua Benjamin Constant, 1637  
Centro, Pelotas / RS  
CEP: 96010-020 Tel.: (53) 3225-3666  
CNPJ: 92.191.659/0001-90  
Licenciado no MAPA sob o n° RS-06037-2



SAC  
0800 703 1346  
sac@labovet.com.br  
www.labovet.com.br

# Previne Mastite



USO VETERINÁRIO  
USO TÓPICO

CONTEÚDO:  
5L

LABOVET

ANTISSÉPTICO  
DESINFETANTE  
EMOLIENTE  
SELADOR  
CICATRIZANTE

ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA  
BOVINOS: ABATE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA  
PARA O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS  
INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS  
ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO  
DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

## PREVINE MASTITE

**Indicação:** indicado na prevenção e controle da mastite, desinfecção e auxílio na cicatrização de ferimentos e umbigo de recém-nascidos e desinfecção e limpeza de estábulos, ordenhadeiras, equipamentos e instrumentos usados na agropecuária, quando diluído 1:10 do produto em água. Pela sua ação emoliente e seladora, evita a rachadura dos tetos e a contaminação até a próxima ordenha.

**Modo de usar:** Via de administração: Uso tópico.

- Na prevenção e controle da mastite: Imergir os tetos, previamente lavados, no produto imediatamente após cada ordenha. Para eficaz prevenção da mastite, efetuar este tratamento também no período seco, uma vez ao dia, diminuindo o número de bactérias nos tetos.

- Na desinfecção de ferimentos e umbigo de recém-nascidos: Após a limpeza do ferimento, aplicar o produto duas vezes ao dia, até completa cicatrização.

- Na desinfecção de estábulos, ordenhadeiras, equipamentos e instrumentos usados na agropecuária, diluir 1 litro do produto em 10 litros de água potável e pulverizar ou enxaguar os materiais a serem desinfetados.

**Precauções:** Evite o contato direto com os olhos e ouvidos. A mistura com soluções salinas pode causar sua precipitação e inativação.

**Espectro antimicrobiano:** *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Pseudomonas*, *Klebsiella*, *Salmonella*, Coliformes e outros agentes causadores de mastite.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

