

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana / Bahia
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ 34.362.558/0001-39
SAC 0800 03 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob o n°
7.774 em 21/05/01.
Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594
Apresentações: Frascos com 50 mL, contendo 10 doses.
PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas
e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não
vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em
condições de estresse / Adotar precauções necessárias
para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma
reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e
desaparece em poucos dias / O uso concomitante com
substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá
interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta
imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e
conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de
validade do produto.
Partida, Fabricação e Vencimento: VIDE FRASCO



COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através de culturas de *Clostridium septicum*, *C. botulinum* C e D, *C. perfringens* B, C e D, *C. novyi* tipo B e C, *sordelli* e uma bactéria obtida através da cultura de *C. chauvoei*, inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÕES: Profilaxia de Botulismo C e D, do Carbúnculo Sintomático (Peste da Manqueira), da Gangrena Gasosa, Enterotoxemia Hemorrágica, Doença do Rim Polposo, Hepatite Necrótica Infeciosa e Morte Súbita dos ruminantes.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar por via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. A dose de 5 mL para bovinos e 2 mL para ovinos e caprinos.

ESQUEMAS DE VACINAÇÃO

ANIMAIS NÃO VACINADOS:
1ª dose aos 4 meses de idade e a 2ª dose revacinar 4 semanas após a 1ª vacinação. Obs: Filhos de mães não vacinadas devem receber a 1ª dose a partir da 2ª semana de vida.

ANIMAIS VACINADOS:
Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.



Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana / Bahia
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br

Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº
7.774 em 21/05/01.

Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594

Apresentações: Frascos com 100 mL, contendo 20 doses.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar
seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de
aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados,
subnutridos ou em condições de estresse / Adotar
precauções necessárias para manejar fêmeas em
gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação.

Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O
uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-
inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e
manutenção da resposta imune após a vacinação /

Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o
uso / Verificar o prazo de validade do produto.

Partida, Fabricação e Vencimento: VIDE FRASCO



COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através
de culturas de *Clostridium septicum*, *C. botulinum* C e D, *C.*
perfringens B, C e D, *C. novyi* tipo B e C, *sordelli* e uma
bactéria obtida através da cultura de *C. chauvoei*, inativadas
pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÕES: Profilaxia de Botulismo C e D, do Carbúnculo
Sintomático (Peste da Manqueira), da Gangrena Gasosa,
Enterotoxemia Hemorrágica, Doença do Rim Polposo,
Hepatite Necrótica Infecciosa e Morte Súbita dos ruminantes.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE
USAR: Administrar por via subcutânea, observando-se os
cuidados usuais de assepsia. A dose de 5 mL para bovinos e 2
mL para ovinos e caprinos.

ESQUEMAS DE VACINAÇÃO

ANIMAIS NÃO VACINADOS:

1ª dose aos 4 meses de idade e a 2ª dose revacinar 4 semanas
após a 1ª vacinação. Obs: Filhos de mães não vacinadas
devem receber a 1ª dose a partir da 2ª semana de vida.

ANIMAIS VACINADOS:

Animais vacinados devem ser revacinados anualmente.

Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a
responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário,
principalmente em casos de surto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem
original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR.

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.



Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana / Bahia
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br

Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob o n°
7.774 em 21/05/01.

Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594

Apresentações: Frascos com 250 mL, contendo 50 doses.
PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar
seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de
aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados,
subnutridos ou em condições de estresse / Adotar
precauções necessárias para manejar fêmeas em
gestação / Pode ocorrer uma reação no local da
aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em
poucos dias / O uso concomitante com substâncias
antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no
desenvolvimento e manutenção da resposta imune após
a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos
residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do
produto.
Partida, Fabricação e Vencimento: VIDE FRASCO



► Botulismo Tipo C e D



► Carbúnculo Sintomático



► Gangrena Gasosa

► Enterotoxemia

► Doença do Rim Polposo

► Hepatite Necrótica

► Morte Súbita



Conteúdo: 250 mL
USO VETERINÁRIO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através de culturas de *Clostridium septicum*, *C. botulinum* C e D, *C. perfringens* B, C e D, *C. novyi* tipo B e *C. sordelli* e uma bacterina obtida através da cultura de *C. chauvoei*, inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÕES: Profilaxia de Botulismo C e D, do Carbúnculo Sintomático (Peste da Manqueira), da Gangrena Gasosa, Enterotoxemia Hemorrágica, Doença do Rim Polposo, Hepatite Necrótica Infecciosa e Morte Súbita dos ruminantes. VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar por via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. A dose de 5 mL para bovinos e 2 mL para ovinos e caprinos.

ESQUEMAS DE VACINAÇÃO

ANIMAIS NÃO VACINADOS:

1ª dose aos 4 meses de idade e a 2ª dose revacinar 4 semanas após a 1ª vacinação. Obs: Filhos de mães não vacinadas devem receber a 1ª dose a partir da 2ª semana de vida.

ANIMAIS VACINADOS:

Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

