Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana / Bahia
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob o n° 7.774 em 2105/01.
Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa CRMV/BA4.594
Apresentações: Frascos com 50 mL, contendo 10 doses.
PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

PART.:
FABR.:
VENC.:

StarVac®

VACINA POLIVALENTE

- Botulismo Tipo C e D
- Carbúnculo Sintomático
- Gangrena Gasosa
- Enterotoxemia
- Doença do Rim Polposo
- Hepatite Necrótica
- Morte Súbita

USO VETERINÁRIO

LABOVET

Conteúdo: 50 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através de culturas de *Clostridium septicum, C. botulinum* C e D, *C. perfringens* B, C e D, *C. novyi* tipo B e *C. sordelli* e uma bacterina obtida através da cultura de *C. chauvoei*, inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÕES: Profilaxia de Botulismo C e D, do Carbúnculo Sintomático (Peste da Manqueira), da Gangrena Gasosa, Enterotoxemia Hemorrágica, Doença do Rim Polposo, Hepatite Necrótica Infecciosa e Morte Súbita dos ruminantes.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. A dose de 5 mL para bovinos e 2 mL para ovinos e caprinos.

ESQUEMAS DE VACINAÇÃO
ANIMAIS NÃO VACINADOS:
1ª dose aos 4 meses de idade e a 2ª dose revacinar 4 semanas após a 1ª vacinação. **Obs:** Filhos de mães não vacinadas devem receber a 1ª dose a partir da 2ª semana de vida.

ANIMAIS VACINADOS:
Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

7 897817 102221

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana / Bahia
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob o n° 7.774 em 21/05/01.
Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa CRMV/BA 4.594
Apresentações: Frascos com 100 mL, contendo 20 doses.
PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

PART.:
FABR.:
VENC.:

StarVac®

VACINA POLIVALENTE

- Botulismo Tipo C e D
- Carbúnculo Sintomático
- Gangrena Gasosa
- Enterotoxemia
- Doença do Rim Polposo
- Hepatite Necrótica
- Morte Súbita

USO VETERINÁRIO

LABOVET

Conteúdo: 100 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através de culturas de *Clostridium septicum, C. botulinum* C e D, *C. perfringens* B, C e D, *C. novyi* tipo B e *C. sordelli* e uma bacterina obtida através da cultura de *C. chauvoei,* inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÕES: Profilaxia de Botulismo C e D, do Carbúnculo Sintomático (Peste da Manqueira), da Gangrena Gasosa, Enterotoxemia Hemorrágica, Doença do Rim Polposo, Hepatite Necrótica Infecciosa e Morte Súbita dos ruminantes.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. A dose de 5 mL para bovinos e 2 mL para ovinos e caprinos.

ESQUEMAS DE VACINAÇÃO
ANIMAIS NÃO VACINADOS:
1ª dose aos 4 meses de idade e a 2ª dose revacinar 4 semanas após a 1ª vacinação. **Obs:** Filhos de mães não vacinadas devem receber a 1ª dose a partir da 2ª semana de vida.

ANIMAIS VACINADOS:
Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

7 897817 202238

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana / Bahia
CEP: 44010-665
Caixa Postal 363
CNPJ 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob o n° 7.774 em 21/05/01.
Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa CRMV/BA 4.594
Apresentações: Frascos com 250 mL, contendo 50 doses.
PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

PART.:
FABR.:
VENC.:

StarVac®

VACINA POLIVALENTE

Botulismo Tipo C e D
Carbúnculo Sintomático
Gangrena Gasosa
Enterotoxemia
Doença do Rim Polposo
Hepatite Necrótica
Morte Súbita

USO VETERINÁRIO

LABOVET

Conteúdo: 250 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através de culturas de *Clostridium septicum, C. botulinum* C e D, *C. perfringens* B, C e D, *C. novyi* tipo B *e C. sordelli* e uma bacterina obtida através da cultura de *C. chauvoei,* inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÕES: Profilaxia de Botulismo C e D, do Carbúnculo Sintomático (Peste da Manqueira), da Gangrena Gasosa, Enterotoxemia Hemorrágica, Doença do Rim Polposo, Hepatite Necrótica Infecciosa e Morte Súbita dos ruminantes.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. A dose de 5 mL para bovinos e 2 mL para ovinos e caprinos.

ESQUEMAS DE VACINAÇÃO
ANIMAIS NÃO VACINADOS:
1ª dose aos 4 meses de idade e a 2ª dose revacinar 4 semanas após a 1ª vacinação. **Obs:** Filhos de mães não vacinadas devem receber a 1ª dose a partir da 2ª semana de vida.

ANIMAIS VACINADOS:
Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

7 897817 202245