

**Proprietário e Fabricante:**

**LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA**

Av. Banco do Nordeste n°22

CIS - Feira de Santana / Bahia

CEP 44010.665

Caixa Postal 363

Tel: (75) 3612-4700

CNPJ 34.362.558/0001-39

Licenciado no MAPA sob n° BA – 000143-0

SAC 0800 703 1346

sac@labovet.com.br

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob o n° 7.774 em 21/05/01.

**Responsável Técnico:**

Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa CRMV/BA 4.594

**Apresentações:** 50mL contendo 10 doses

**CUIDADOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS:**

- Agitar antes e durante o uso.
- Usar seringas e agulhas estéreis.
- Desinfetar o local de aplicação.
- Não vacinar animais doentes, debilitados ou convalescentes.
- Não vacinar cabras e ovelhas em gestação.
- Verificar o prazo de validade do produto.
- Conservar a temperatura entre 2°C e 8°C - Não congelar.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- O uso concomitante com substâncias antimicrobianas ou anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação.



**StarVac®**  
**VACINA POLIVALENTE**

**Botulismo Tipo C e D**

**Carbúnculo Sintomático**

**Gangrena Gasosa**

**Enterotoxemia**

**Morte Súbita**

**Doença do Rim Polposo**

**USO VETERINÁRIO**

**LABOVET**

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

**COMPOSIÇÃO:**

Produzida a partir de toxinas e uma bacterina obtidas através das culturas de *Clostridium chauvoei*, *C. botulinum* tipo C e D, *C. septicum*, *C. novyi*, *C. perfringens* tipo B, C e D e *C. sordelli*, inativadas pelo formol e adsorvidas em hidróxido de alumínio gel.

**INDICAÇÃO:**

Indicada para bovinos, ovinos e caprinos, na profilaxia do Botulismo, Enterotoxemia, Carbúnculo Sintomático (Peste da Manqueira), Gangrena Gasosa, Doença do Rim Polposo e Morte Súbita dos Ruminantes.

**DOSES, VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:**

Administrar por via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. **Bovinos:** 5 mL. 1ª dose aos 4 meses de idade e a 2ª dose 4 semanas após a 1ª vacinação. **Ovinos e Caprinos:** 2 mL. Vacinar os cordeiros e cabritos aos 30 dias de idade, repetir após 4 semanas. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados a critério do Médico Veterinário.