

VACINA - THREECELL VAC[®]

Vacina combinada contra a CINOMOSE,
PARVOVIROSE e CORONAVIROSE CANINA

USO VETERINÁRIO - INJETÁVEL

COMPOSIÇÃO:

A fração liofilizada é composta de suspensões de vírus vivo atenuado de Cinomose e Parvovírus canino. A fração líquida é composta de suspensão viral inativada do Coronavírus canino.

INDICAÇÕES:

Profilaxia das infecções causadas pelo (s) vírus da:

- Cinomose canina
- Parvovirose canina
- Coronavirose canina

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR:

Administrar por via subcutânea, observando os cuidados usuais de assepsia. Diluir a fração liofilizada com a fração líquida da vacina, no momento do uso, agitando até a total dissolução da pastilha.

Dose: 1 mL

Preparação do produto:

1. Usar seringa e agulha estéril (calibre 25 x 7).
2. Aspirar todo o conteúdo da fração líquida.
3. Reconstituir a fração liofilizada.
4. Agitar até obter a completa reconstituição da pastilha.
5. Agitar a vacina antes do uso.

ESQUEMA DE VACINAÇÕES RECOMENDADOS:

VACINAÇÃO PRIMÁRIA: FILHOTES

A presença de anticorpos maternos circulantes nos filhotes interfere no desenvolvimento da imunidade ativa. Desta forma, o programa de vacinação recomendado é o seguinte:

- 1ª Dose: 6 semanas
- 2ª Dose: 9 semanas
- 3ª Dose: 12 semanas

Para animais expostos a riscos ou que habitam zonas endêmicas e frequentam locais contaminados é recomendada a administração de uma 4ª dose às 16 semanas de idade. O ciclo de proteção oferecido pela vacina é obtido após 21 dias da administração da 3ª dose. O programa de vacinação poderá ser alterado a Critério do Médico Veterinário.

VACINAÇÃO DE REFORÇO:

Revacinar os animais anualmente, com dose única de 1 mL.

PRECAUÇÕES:

- Agitar antes e durante o uso.
- Usar seringas e agulhas novas, descartáveis e estéreis.
- Desinfetar o local da aplicação.
- A vacinação deve ser precedida de um exame clínico minucioso por um Médico Veterinário.

- Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse.
- Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias.
- Incinerar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso.
- Verificar o prazo de validade do produto.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento da resposta imune após a vacinação.
- Não utilizar qualquer tipo de substância química que possa inativar o produto.
- O vacinador deverá lavar e desinfetar as mãos após o trabalho.
- No caso de ocorrência de reação anafilática, aplicar imediatamente adrenalina 1:1000.
- Utilizar somente o diluente fornecido pelo fabricante da vacina.

CONSERVAÇÃO:

Conservar em temperatura de 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR.

APRESENTAÇÕES:

Caixas Isotérmicas contendo 15 frascos com 1 dose da fração liofilizada e 15 frascos com 1mL da fração diluente para reconstituição.

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 10.159 em 13/10/15.

Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594

Proprietário e Fabricante:



LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

Av. Banco do Nordeste, nº 22

Caixa Postal: 363 - Centro Industrial do Subaé

Feira de Santana - BA

CEP: 44010-665

Fone: (75) 3612-4700

CNPJ: 34.362.558/0001-39

Licenciado no MAPA sob o nº BA - 000143-0

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 703 1346 e-mail: sac@labovet.com.br