

Proprietário e Fabricante:
Labovet Produtos Veterinários Ltda

Av. Banco do Nordeste, Nº 22 - CIS

C. Postal 363 - Tel: (75) 3612-4700

CNPJ. 34.362.558/0001-39 BA - 000143-0

Feira de Santana - BA Cep: 44010-665

SAC: 0800 703 1346

sac@labovet.com.br

Licenciado no Ministério da Agricultura

Sob o nº 7.774 em 21/05/01

Responsável Técnico:

Dr^a Priscila O. Falcão Paixão Costa CRMV/BA 4.594

Apresentações: Frascos de 50mL, 100mL e 250mL.

CUIDADOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS:

- Agitar antes e durante o uso.
- Usar seringas e agulhas estéreis.
- Desinfetar o local de aplicação.
- Não vacinar animais doentes, debilitados ou convalescentes.
- Não vacinar cabras e ovelhas em gestação.
- Verificar o prazo de validade do produto.
- Conservar a temperatura entre 2°C e 8°C - Não congelar.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- O uso concomitante com substâncias antimicrobianas ou anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação.

PART.:

FABR.:

VENC.:



StarVac®

VACINA POLIVALENTE

Botulismo Tipo C e D

Carbúnculo Sintomático

Gangrena Gasosa

Enterotoxemia

Morte Súbita

USO VETERINÁRIO

**LABO
VET**

Conteúdo: 250mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

COMPOSIÇÃO:

Bacterina- Toxóide constituída de *C.chauvoei*, *C.botulinum* tipo C e D, *C.septicum*, *C. novyi*, *C.perfringens* tipo B, C e D e *C.sordellii*, inativados pelo formol e adsorvidas em hidróxido de alumínio.

INDICAÇÕES:

Profilaxia de botulismo, da gangrena gasosa carbúnculo sintomático (peste da manqueira) enterotoxemia, doença do rim polposo e morte súbita dos ruminantes.

MODO DE USAR:

Administrar através da via subcutânea a dose de 5mL para bovinos e 2mL para ovinos e caprinos.

**ESQUEMA DE VACINAÇÃO
ANIMAIS NÃO VACINADOS:**

1ª dose vacinar aos 4 meses de idade e a 2ª dose revacinar 4 semanas após a 1ª vacinação. Obs: Filhos de mães não vacinadas devem receber a 1º dose a partir da 2ª semana de vida.

ANIMAIS VACINADOS:

Revacinar anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados a critério do Médico Veterinário.

