

THREECELL VAC[®]

Vacina combinada contra a Cinomose,
Parvovirose e Coronavirose canina

USO VETERINÁRIO - INJETÁVEL

COMPOSIÇÃO:

A fração liofilizada é composta de suspensões de vírus vivo atenuado de Cinomose e Parvovirus canino. A fração líquida é composta de suspensão viral inativada do Coronavírus canino.

INDICAÇÃO:

Profilaxia das infecções causadas pelo Vírus da Cinomose, Vírus da Parvovirose e Coronavirose canina.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR:

Administrar por via subcutânea, observando os cuidados usuais de assepsia. Diluir a fração liofilizada com a fração líquida da vacina, no momento do uso, agitando até a total dissolução da pastilha.

Dose: 1mL.

Preparação do produto:

1. Usar seringa e agulha nova, descartável e estéril (calibre 25 x 7).
2. Aspirar todo o conteúdo da fração líquida.
3. Reconstituir a fração liofilizada, somente com o diluente fornecido pelo fabricante.
4. Agitar até obter a completa reconstituição da pastilha.
5. Agitar a vacina antes e durante o uso.

ESQUEMA DE VACINAÇÕES RECOMENDADOS:

VACINAÇÃO PRIMÁRIA: FILHOTES

A presença de anticorpos maternos circulantes nos filhotes interfere no desenvolvimento da imunidade ativa. Desta forma, o programa de vacinação recomendado é o seguinte:

- 1ª Dose: 6 semanas
- 2ª Dose: 9 semanas
- 3ª Dose: 12 semanas

Para animais expostos a riscos ou que habitam zonas endêmicas e freqüentam locais contaminados é recomendada a administração de uma 4ª dose às 16 semanas de idade. O ciclo de proteção oferecido pela vacina é obtido após 21 dias da administração da 3ª dose. O programa de vacinação poderá ser alterado a critério do Médico Veterinário.

VACINAÇÃO DE REFORÇO:

Animais vacinados devem ser revacinados anualmente, com dose única de 1mL, ou a critério do Médico Veterinário.

PRECAUÇÕES:

- Desinfetar o local da aplicação.
- A vacinação deve ser precedida de um exame clínico minucioso por um Médico Veterinário.
- Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse.

- Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias.
- Incinerar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso.
- Verificar o prazo de validade do produto.
- O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento da resposta imune após a vacinação.
- Não utilizar qualquer tipo de substância química que possa inativar o produto.
- O vacinador deverá lavar e desinfetar as mãos após a aplicação.
- No caso de ocorrência de reação anafilática, aplicar imediatamente adrenalina 1:1000.

CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C e 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não reutilizar a embalagem vazia.

APRESENTAÇÃO:

Caixas Isotérmicas contendo 15 frascos com 1 dose da fração liofilizada e 15 frascos com 1mL da fração diluente para reconstituição.

Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 10159 em 13/10/15.

Responsável Técnico: Dr.ª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA 4.594

Proprietário e Fabricante:



LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

Av. Banco do Nordeste nº22
Centro Industrial do Subaé
Feira de Santana/BA
Caixa Postal 363
Tel.: (75) 3612-4700
CEP: 44010-665
CNPJ: 34.362.558/0001-39
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0

INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC
0800 703 1346
sac@labovet.com.br
www.labovet.com.br