

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 453 - OS
Feira de Santana / Bahia
CEP: 44010-865 - Caixa Postal 363
CNPJ: 14.362.559/0001-99
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br - www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0

Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa - CRMV/BA-594
Apresentação: Frascos com 50 mL, contendo 10 doses.
PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local de aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

PART.:
FABR.:
VENC.:

Clostrimune 10
TH

VACINA BACTERINA TOXÓIDE POLIVALENTE
CARBÚNCULO SINTOMÁTICO
GANGRENA GASOSA
ENTEROTOXEMIA HEMORRÁGICA
DOENÇA DO RIM POLPOSO
HEPATITE NECRÓTICA
MORTE SÚBITA
EDEMA MALIGNO
TETANO
HEMOGLOBINÚRIA BACILAR
USO VETERINÁRIO
INJETÁVEL
Conteúdo: 50mL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

LABOVET

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através de culturas de *Clostridium septicum*, *C. novyi* tipo B, *C. sorrelletii*, *C. perfringens* tipo A, B, C e D, *C. tetani* e *C. haemolyticum* e uma bacterina obtida através da cultura de *C. chauvoei*, inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia de Carbúnculo Sintomático (Manqueira), Gangrena Gasosa, Enterotoxemia (Enterite Hemorrágica), Doença do Rim Polposado, Hepatite Necrótica, Morte Súbita, Edema maligno, Tetano e Hemoglobinúria bacilar dos bovinos, ovinos e caprinos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. A dose de 5 mL para bovinos e 2 mL para ovinos e caprinos.

ESQUEMAS DE VACINAÇÃO

ANIMAIS NÃO VACINADOS:

1ª dose aos 4 meses de idade e 2ª dose 4 semanas após a 1ª vacinação. Obs.: Filhos de mães não vacinadas devem receber a 1ª dose a partir da 2ª semana de vida. Vacinar os cordeiros e cabritos aos 30 dias de idade; repetir após 4 semanas, e as ovelhas e cabras 30 a 40 dias antes da parição.

ANIMAIS VACINADOS: Animais vacinados devem ser revacinação anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. **NÃO CONGELAR.** Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.



Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana / Bahia
CEP: 44010-665 - Caixa Postal 363
CNPJ 34.362.553/0001-39
SAC 0800 703 1346
sac@labovet.com.br www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 10.227
em 01/04/19.
Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
CRMV/BA4.594

Apresentações: Frascos com 100 mL, contendo 20 doses.
PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e
agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar
animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições
de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar
fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da
aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos
dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e
anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e
manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar
os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar
o prazo de validade do produto.

PART.:
FABR.:
VENC.:



Clostrimune 10 TH



VACINA BACTERINA TOXÓIDE POLIVALENTE
CARBÚNCULO SINTOMÁTICO
GANGRENA GASOSA
ENTEROTOXEMIA HEMORRÁGICA
DOENÇA DO RIM POLPOSO
HEPATITE NECRÓTICA
MORTE SÚBITA
EDEMA MALIGNO
TÉTANO
HEMOGLOBINÚRIA BACILAR

USO VETERINÁRIO
INJETÁVEL

Conteúdo: 100mL
INDÚSTRIA BRASILEIRA



COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através de
culturas de *Clostridium saproscium*, *C. novyi* tipo B, *C. sordelli*, *C.*
perfringens tipo A, B, C e D, *C. tetani* e *C. haemolyticum* e uma
bacterina obtida através da cultura de *C. chauvoei*, inativadas pelo
formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia do Carbúnculo Sintomático (Manqueira),
Gangrena Gasosa, Enterotoxemia (Enterite Hemorrágica), Doença
do Rim Polposo, Hepatite Necrótica, Morte Súbita, Edema maligno,
Tétano e Hemoglobinúria bacilar dos bovinos, ovinos e caprinos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar
pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia.
A dose é de 5 mL para bovinos e 2 mL para ovinos e caprinos.

ESQUEMAS DE VACINAÇÃO

ANIMAIS NÃO VACINADOS:

1ª dose aos 4 meses de idade e a 2ª dose 4 semanas após a 1ª
vacinação. Obs.: Filhos de mães não vacinadas devem receber a 1ª
dose a partir da 2ª semana de vida. Vacinar os cordeiros e cabritos aos
30 dias de idade, repetir após 4 semanas, e as ovelhas e cabras 30 a
40 dias antes da partição.

ANIMAIS VACINADOS: Animais vacinados devem ser revacina-
dos anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados
sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário,
principalmente em casos de surto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com
temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do
alcance de crianças e animais domésticos.



Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS

Feira de Santana / Bahia
CEP: 44010-665 - Caixa Postal 363
CNPJ 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346

sac@labovet.com.br www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob o n°
10.227 em 01/04/19.

Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão Paixão
Costa CRMV/BA4.594

Apresentações: Frascos com 250 mL, contendo 50 doses.

PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto.

PART.:

FABR.:

VENC.:

Clostrimune10[®]

TH

VACINA BACTERINA TOXÓIDE POLIVALENTE

CARBÚNCULO SINTOMÁTICO

GANGRENA GASOSA

ENTEROTOXEMIA HEMORRÁGICA

DOENÇA DO RIM POLPOSO

HEPATITE NECRÓTICA

MORTE SÚBITA

EDEMA MALIGNO

TÉTANO

HEMOGLOBINÚRIA BACILAR

USO VETERINÁRIO
INJETÁVEL

Conteúdo: 250 mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

LABOVET

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através de culturas de *Clostridium septicum*, *C. novyi* tipo B, *C. sordellii*, *C. perfringens* tipo A, B, C e D, *C. tetani* e *C. haemolyticum* e uma bacterina obtida através da cultura de *C. chauvoei*, inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia do Carbúnculo Sintomático (Manqueira), Gangrena Gasosa, Enterotoxemia (Enterite Hemorrágica), Doença do Rim Polposo, Hepatite Necrótica, Morte Súbita, Edema maligno, Tétano e Hemoglobinúria bacilar dos bovinos, ovinos e caprinos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. A dose de 5 mL para bovinos e 2 mL para ovinos e caprinos.

ESQUEMAS DE VACINAÇÃO

ANIMAIS NÃO VACINADOS:

1ª dose aos 4 meses de idade e a 2ª dose 4 semanas após a 1ª vacinação. Obs.: Filhos de mães não vacinadas devem receber a 1ª dose a partir da 2ª semana de vida. Vacinar os cordeiros e cabritos aos 30 dias de idade, repetir após 4 semanas, e as ovelhas e cabras 30 a 40 dias antes da parição.

ANIMAIS VACINADOS: Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

