

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS
Feira de Santana / Bahia
CEP: 44010-665 - Caixa Postal 363
CNPJ 34.362.558/0001-39
SAC 0800 703 1346

sac@labovet.com.br www.labovet.com.br
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0
Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº
10.227 em 01/04/19.

Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa
- CRMV/BA 4.594

Apresentações: Frascos com 250 mL, contendo 50 doses.

PRECAUÇÕES:

- Agitar antes e durante o uso.
- Usar seringas e agulhas estéreis.
- Desinfetar o local de aplicação.
- Não vacinar animais doentes, debilitados ou convalescentes.
- Não vacinar cabras e ovelhas em gestação.
- Verificar o prazo de validade do produto.
- Conservar a temperatura entre 2°C e 8°C - Não congelar.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- O uso concomitante com substâncias antimicrobianas ou anti-inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a vacinação.

PART.:
FABR.:
VENC.:

**RESERVA
DE VERNIZ**

Clostrimune 10 TH

**VACINA BACTERINA TOXÓIDE POLIVALENTE
CARBÚNCULO SINTOMÁTICO
GANGRENA GASOSA
ENTEROTOXEMIA HEMORRÁGICA
DOENÇA DO RIM POLPOSO
HEPATITE NECRÓTICA
MORTE SÚBITA
EDEMA MALIGNO
TÉTANO
HEMOGLOBINÚRIA BACILAR**

Conteúdo: **250** mL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

USO VETERINÁRIO
INJETÁVEL

LABOVET

COMPOSIÇÃO:

Bacterina - Toxóide constituída de *C. chauvoei*, *C. septicum*, *C. novyi* tipo B, *C. sordelli*, *C. perfringens* tipo A, B, C e D, *C. tetanii*, *C. haemolyticum*, inativados pelo formol e adsorvidas em hidróxido de alumínio.

INDICAÇÕES:

Profilaxia do carbúnculo sintomático (peste da manqueira), gangrena gasosa, enterotoxemia, doença do rim polposo, morte súbita dos ruminantes, hepatite necrótica, edema maligno, tétano e hemoglobinúria bacilar.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR:

1ª dose vacinar aos 4 meses de idade e a 2ª dose revacinar 4 semanas após a 1ª vacinação. Obs: Filhos de mães não vacinadas devem receber a 1ª dose a partir da 2ª semana de vida.

- ANIMAIS VACINADOS:

Revacinar anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados a critério do Médico Veterinário.

