

PART.:

FABR.:

VENC.:

Proprietário e Fabricante:
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA

Av. Banco do Nordeste n°22

Centro Industrial do Subaé

Feira de Santana/BA

Caixa Postal 363

Tel.: (75) 3612-4700

CEP: 44010-665

CNPJ: 34.362.558/0001-39

SAC 0800 703 1346 sac@labovet.com.br

www.labovet.com.br

Licenciado no MAPA sob n° BA-000143-0

Produto licenciado no Ministério da

Agricultura sob n° 10.227 em 01/04/19 .

Responsável Técnico:

Dr^a Priscila O. Falcão Paixão Costa

CRMV/BA 4.594

Apresentação:

Frasco com 250mL, contendo

50 doses.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na

embalagem original, com temperatura entre

2°C a 8°C. **NÃO CONGELAR.** Manter fora

do alcance de crianças e animais domésticos.

Não reutilizar a embalagem vazia.

Clostrimune10[®]

TH

LABOVET

**VACINA BACTERINA TOXÓIDE
POLIVALENTE CONTRA:
CARBÚNCULO SINTOMÁTICO
GANGRENA GASOSA
ENTEROTOXEMIA HEMORRÁGICA
DOENÇA DO RIM POLPOSO
MORTE SÚBITA
HEPATITE NECRÓTICA
EDEMA MALIGNO
TÉTANO
HEMOGLOBINÚRIA BACILAR**

**Uso Veterinário
Injetável**

**Conteúdo: 250mL
INDÚSTRIA BRASILEIRA**

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas de *Clostridium septicum*, *C. novyi* tipo B, *C. sordelli*, *C. perfringens* tipo A, B, C e D, *C. tetanii* e *C. haemolyticum* e uma bacterina obtida através da cultura de *C. chauvoei*, inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia do Carbúnculo Sintomático (Manqueira), Gangrena Gasosa, Hepatite Necrótica, Enterotoxemia (Enterite Hemorrágica), Doença do Rim Polposo, Morte Súbita, Edema maligno, Tétano e Hemoglobinúria bacilar dos bovinos, ovinos e caprinos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. Bovinos: 5 mL. 1ª dose aos 4 meses de idade e a 2ª dose 4 semanas após a 1ª vacinação. Obs: Filhos de mães não vacinadas devem receber a 1ª dose a partir da 2ª semana de vida. Ovinos e Caprinos: 2 mL. Vacinar os cordeiros e cabritos aos 30 dias de idade, repetir após 4 semanas e as ovelhas e cabras 30 a 40 dias antes da parição. Animais vacinados devem ser revacinados anualmente ou a critério do Médico veterinário.

PRECAUÇÕES: Adotar precauções necessárias para manejar fêmeas em gestação / Agitar antes e durante o uso / Usar seringas e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em condições de estresse / Pode ocorrer uma reação no local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em poucos dias / Incinerar os frascos vazios e conteúdos residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do produto / O uso concomitante com substâncias antimicrobianas e anti inflamatórias poderá interferir no desenvolvimento da resposta imune após a vacinação / Não utilizar qualquer tipo de substância química que possa inativar o produto / O vacinador deverá lavar e desinfetar as mãos após a aplicação.

