

Proprietário e Fabricante:  
LABOVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA  
Av. Banco do Nordeste, 455 - CIS Feira de Santana / Bahia  
CEP: 44010-665 - Caixa Postal 363  
CNPJ 34.362.558/0001-39  
SAC 0800 703 1346  
sac@labovet.com.br www.labovet.com.br  
Licenciado no MAPA sob nº BA-000143-0  
Produto licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº  
10.231 em 04/04/19.  
Responsável Técnico: Drª Priscila O. Falcão Paixão Costa  
CRMV/BA 4.594  
Apresentações: Frascos com 250 mL, contendo 50 doses.  
PRECAUÇÕES: Agitar antes e durante o uso / Usar seringas  
e agulhas estéreis / Desinfetar o local de aplicação / Não  
vacinar animais doentes, parasitados, subnutridos ou em  
condições de estresse / Adotar precauções necessárias para  
manejar fêmeas em gestação / Pode ocorrer uma reação no  
local da aplicação. Esta reação é transitória e desaparece em  
poucos dias / O uso concomitante com substâncias  
antimicrobianas e anti-inflamatórias poderá interferir no  
desenvolvimento e manutenção da resposta imune após a  
vacinação / Descartar os frascos vazios e conteúdos  
residuais após o uso / Verificar o prazo de validade do  
produto.



7169781712027711

Partida, Fabricação  
e Vencimento:  
VIDE FRASCO

# StarVac12

VACINA POLIVALENTE BTH

## PROTEÇÃO CONTRA:

- Botulismo Tipo C e D
- Enterotoxemia
- Carbúnculo Sintomático
- Tétano
- Gangrena Gasosa
- Morte Súbita
- Hepatite Necrótica
- Edema Maligno
- Hemoglobinúria Bacilar
- Doença do Rim Polposo

+ Antígeno  
Perfringens A

USO VETERINÁRIO  
INJETÁVEL

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Conteúdo:  
250mL

LABO  
NET

COMPOSIÇÃO: Produzida a partir de toxinas obtidas através de culturas de *Clostridium septicum*, *C. novyi* tipo B, *C. sordelli*, *C. perfringens* tipo A, B, C e D, *C. botulinum* tipo C e D, *C. tetani* e *C. haemolyticum* e uma bacterina obtida através da cultura de *C. chauvoei*, inativadas pelo formol e adsorvidas pelo hidróxido de alumínio gel.

INDICAÇÃO: Profilaxia do Carbúnculo Sintomático (Manqueira), Gangrena Gasosa, Enterotoxemia (Enterite Hemorrágica), Doença do Rim Polposo, Hepatite Necrótica, Morte Súbita, Edema maligno, Botulismo C e D, Tétano e Hemoglobinúria bacilar dos bovinos, ovinos e caprinos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSES E MODO DE USAR: Administrar pela via subcutânea, observando-se os cuidados usuais de assepsia. A dose de 5 mL para bovinos e 2 mL para ovinos e caprinos.

ESQUEMAS DE VACINAÇÃO

ANIMAIS NÃO VACINADOS:

1ª dose aos 4 meses de idade e a 2ª dose revacinar 4 semanas após a 1ª vacinação. Obs.: Filhos de mães não vacinadas devem receber a 1ª dose a partir da 2ª semana de vida.

ANIMAIS VACINADOS: Animais vacinados devem ser revacinados anualmente. Outros esquemas de vacinação poderão ser adotados sob a responsabilidade exclusiva do Médico Veterinário, principalmente em casos de surto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto na embalagem original, com temperatura entre 2°C a 8°C. NÃO CONGELAR. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

2400